

M




L



Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/hortusfloridusin00pass>



Rembertus Dodonaeus

Carolus Clusius

HORTUS FLORIDUS

In quo rariorum & minus vulgarium
florum Icones ad vivam veramq̃ formam
accuratissime delineatae.

Et secundum quatuor anni tempora divise
exhibentur

Incredibili labore ac diligentia
Crisp: Passaei junioris

Delineatae ac suum in ordinem redactae A. 1614.

Exstant Arnhe mij. Apud Ioannem Ianssonium Bibliopolam ibid.

Crisp Passaeus excud. vlt.



BENIGNO FLORVM AC OMNI-
VM NATVRÆ IPSIVS ELEGANTIARVM
AMATORI AC ADMIRATORI. S. D.

CR. PASSEVS FIL.



Ignitatem ac elegantiam Florum non alio maiore encomio illustrare ac celebrem reddere possum, quàm ipsius summi patris filij, qui divina sua vocis oraculo omnem Imperij mundani, atque adeo Solomonis, quotquot unquam fuerunt regum sapientissimi ac ditissimi, maiestatem ijs inferiorem pronuntiavit; neque id sine iustissimâ causâ cum facile omnem humani ingenij industriam infinitâ suâ, sive colorum pulcritudine, sive formarum varietate, sive odorum suavitate, sive foliorum elegantia, superent: ita ut inter omnia naturæ omniparentis miracula nullum illustrius aut magis mirandum prodeat spectaculum, quàm illud, quod terra in procreandis floribus continuò edit. In quo sanè illustre exemplum hominibus suæ fragilitatis proponitur; hodie n. flos summa pulcritudine nitet, ac cum oculis spectantium quoque animos ad se allicit, qui sequenti inde die cum omni suo decore exaruisse comperitur. Quare patientissimus mortalium Iobus apta admodum similitudine vitam humanam cum flore composuisse legitur. Vnde etiam tam olim quam hoc nostro potissimum ævo, plures eximij ac excellentis ingenij viri inventi sunt, qui omni studio ad interiorem hanc considerationem animum applicuerunt, nullis sumptibus aut laboribus parcentes, quin continua indagazione naturæ hac arcana recluderent, & quotidie novos & invisos antea flores ac herbas in lucis Theatrum producerent: Inter quos principes Dodonæus ac Clusius nuper admodum vixerunt, doctissimis & curiosissimis libris ad posteritatem transmissis, plures suæ sectæ discipulos relinquentes, qui non minus ac olim Romani FLORÆ DEÆ, honestiore tamen fama, litare videntur. Verùm cum sit à debilitate ingenij mei alienum florum hic encomia sten agere, ad institui huius tantummodo rationem reddendam, properabo. Cum n. proposuissem

artis mea Tyrociniū (quo hactenus sub patris signis delitui) deponere, eiusq; nihilominus laudabilibus insistere vestigijs in animo haberem, nihil mihi prius faciendum putavi, quàm ut memor Horatiani praecepti, miscerem vilia dulcibus, quod maximè presenti hoc opere palam me facturum spero, propterea nulli me quantumvis ingentes labores deterruerunt, in vestigandis depingendisq; imaginibus rariorem ac minimè vulgariū florū, quos ad ipsam veritatem & vivam formam quam proximè expressi, simul cum suis folijs & radicibus; quibus addidi descriptionem satis planam & plenam, & varijs in linguis nomina; & ne quid desit rationem adiunxi, quàm aptissimè colores singulorum florū exprimendi. Neque me ab incepto revocavit, quod & ab alijs hoc tempore & antiè, similia tentata sint, cum plura in ijs à multis videam desiderari, quae à me vel correctae, vel suppletæ, vel additæ de novo invenies, cuius rei benignitatis vestra iudicium erit. Neque n. unquam terra fecunda mater otiosa est, præcipuè ab industriâ humanâ provocata, quin quotidie novis pangendis floribus fatiscat, & humana curiositas ex omni solo non visos antea fructus & flores adducat. Distinxi a. secundum quatuor anni tempora flores, & in ordinem quodammodo redegi, ut quo tempore potissimum quique nascentur, apertum sit. Nam licet Ver innumeris coroneur floribus, & huic æstas odoriferâ caliditate succedat, non tamen Autumnus omnino hoc honore privandus est, qui cum fructibus, quibus annum ipsum auget, elegantissimos quoque flores producere solet; quin & Hyems, quae claudere terra sinum horrendo frigore dicitur, accedente hominum industriâ florū quoque varietate inter nives & grandines mite scit, idque nuper ex alieno orbe adductis plantis, quae vel invito cælo florescant: adeo ut iam Batavia nostra vel cum quovis cælo ac solo certare eâ in re didicerit, undique patente per apertum Oceanum viâ, quâ quicquid in orbe rarum advehitur. Et licet hic obiectum florū amatoribus non diffitear, peregrinos flores oculos quidem suâ raritate pascere, sed boni odoris expertes esse; idq; sæpius ob mutationem terræ & aëris, calorisq; defectu fieri contingat, ingenio tamen succurri posse, nec omnes flores exoticos inodores esse, verum est. Sumi n. Tulipæ, sumi Lilia Byzantina alijsq; quàm plures suavi & amabili odore fragrantæ, & Rosæ pleno multiplici folio candidæ ab odore incundo Muscæ vulgo dictæ creduntur. Sed ne longior sim, hoc opus à vere incipit, & veluti a re presenti procedit. Suo n. tempore flores quosq; depinximus, ac inde picturas iterum cum ipsâ Vitâ contulimus, omnium colores ac formas nostris non auribus tantum sed & oculis ut sic tandem in ære melius exprimerentur, haurientes. Tu igitur benigne inspector, boni & æqui consule hunc meum laborem, in tuam gratiam susceptum, & eo cum animi suavitate quàm diuētissimè perfrue.

AD CR. PASSEVM FIL.
DE HORTO FLORIDO exquisitissimâ eius curâ & summo labore
in lucem nuper dato.

FLOS brevis etatis, bullæq₃ simillimus,
omnem

Conqueritur venerē quàm cito abire suam.

Tu das etatem ingenio, tuq₃ exprimis ære

Flores, mansuros addis & articulos:

Quin tu tã varios (quod vix imitabitur ullus)

Pingis in aquali scilicet ære Crocos;

Totque colorum alias Violas, pulcrasq₃ Ane-
monas,

Cærule flammeolis Colchica cum Tulipis;

Fulvos Narcissos, & purpureos Hyacinthos,

Candida sanguineis lilia mixta Rosis.

Nec brevis etatis sunt hi P A S S A E E, sed ævū

Vel duro melius te duce in ære ferent.

Æternum sic tu producis floribus ævum,

Sicq₃ æterna tibi fama superstes erit.

A. BVCHELIVS L.

VT mare fit ævulum dulci cum stringitur aurâ,
Et quatitur repido fraxina virga roto;
Sic quoque mens stimulis agitur dia benignis,
Nec peritura simul cum Ione screptra gerit,

Tactaq₃ divina connato laudis amore

Ingenij vires exerit illa suas:

Et Cælum Terramq₃ suis meretur habenis,

Torpentesq₃ animos ad nova quaque vocat:

Et modo P A S S A E V S viridi quem cernis in horto

Floribus ornatum diva thalia tuo,

Hoc studet ut semper quicquam producat in orbem

Noscatur mundo quo sua sedulitas.

Exprimit eximias formas, florumque corollas

Ære: & quàm vario germine floret humus:

Ære coloratos distinguens ordine flores

Aspera quos nunquam desiderabit hycms.

Scilicet ære docet (quoniam labor omnia vincit)

Ætatem Flores continuare suam.

Hinc Deus antiquæ reparator stirpis & autor

Te P A S S A E E diu ritè virere sinat.


Jacobus Valentinus vander
Voort. Med.

INDEX

HORTI FLORIDI, VERNALIS.

<p>Hepatica trifolia carulea polyanthos, & Hepatica flore niuco. fol. 1.</p> <p>Crocus Neapolitanus flore purpur: Major & minor. fol. 2.</p> <p>Pseudo Narcissus pleno flore, & Narciss: duplici tubo. fol. 3.</p> <p>Narciss: omnium maximus simplex & duplex. fol. 4.</p> <p>Muscari obsoleto albo & Muscari flore luteo. fol. 5.</p> <p>Hyacinthus Aquitanicus Lilijfol: & Hyacinthus Stell: Iij: flore albo. fol. 6.</p> <p>Primula veris flore pleno, & primu: veris flore gemino. fol. 7.</p> <p>Auricula vrsi flore luteo, & Auricula vrsi flore violaceo. fol. 8.</p> <p>Chamaeiris colore ceruleo violaceo, & Cham: colore purp: satur. fol. 9.</p> <p>Hyacinthus Orientalis carul: & Hyacinthus Orientalis pall. purp. fol. 10.</p> <p>Hyacinth^o Orienta. carule: foli, & Hyacinth: Oriema pleno flore. fol. 11.</p> <p>Corona Imperialis duplici classe florum. fol. 12.</p> <p>Anemone Tenuifolia violaceo, Anemone Coccineo flore & Anemone Princeſſe. fol. 13.</p> <p>Anemone tenuifol. pleno flore pallido rubro, & Anemone tenuif. pleno flore Coccineo. fol. 14.</p> <p>Anemone latifolia verdum: Anemone latif: carneo: & Anemone simplici Orengiacaflore. fol. 15.</p> <p>Anemone Pavo tam simplici quàm duplici flore. fol. 16.</p> <p>Anemone latifolia Chalcidonica polyanthos, & Anem: Cacumeni. fol. 17.</p> <p>Eranthemum, & Bupthalmum Dodon: fol. 18.</p> <p>Narcissus Medio purpur: & medio luteus Lob: fol. 19.</p> <p>Narcissus oblongo calice & Narcissus amplo calice. fol. 20.</p> <p>Narcissus totus albidus, & Narciss: flore multiplice. fol. 21.</p> <p>Narcissus Maximus griseus calice flavo, & Narciss: major mediolute^o</p>	<p style="text-align: center;">Itali:</p> <p>Narcissus tuncifolius amplo cal: & Narcissus tuncifol: reflexo. fol. 22.</p> <p>Narcissus tuncifol: pleno flore & Narciss: maximo cali: floralut: o fol. 24.</p> <p>Lilium Persicum. fol. 25.</p> <p>Tulipa praeox flore purpur: Tulipa flore albo & Tulipa purpur: oris albis. fol. 26.</p> <p>Tulipa Persica & Tulipa cretensis. fol. 27.</p> <p>Tulipa pumilus, & Tulipa bononiensis. fol. 28.</p> <p>Tulipa ducis, Tulipa lutea ac Tulipa alba rosea mixta. fol. 29.</p> <p>Tulipa sanguineo & Tulipa Cinabar cum albi flamm: fol. 30.</p> <p>Tulipa Honneſſi, & Tulipa alba Coccin: flam: ac Tulipa Coccin: flam: fol. 31.</p> <p>Tulipa alba cum rubro flam: & fundo purpur & Tulipa eidem simil: fol. 32.</p> <p>Fritillaria flore purpureo & Fritillaria flore albo. fol. 33.</p> <p>Fritillaria flore luteo rubro punct: & Fritilar: maxima Polyanthos. fol. 34.</p> <p>Ornithogalum maius & minus. fol. 35.</p> <p>Asphodelus albus maior & Asphodelus luteus. fol. 36.</p> <p>Aquilina Roseo flore & Aquilina flore stell. fol. 37.</p> <p>Ranunculus Asiaticus simp: & Ranunc: dupl: fol. 38.</p> <p>Ranunculus albus pleno flore & Ranunc: Maxim: globos: fol. 39.</p> <p>Saivion basilicon mas & femina. fol. 40.</p> <p>Narcissus tuncifol: maior & minor. fol. 41.</p>
---	---

FINIS.



Septentrio

Occidentis

Septentrio

Septentrio

HEPATICAE FLO-
RE NIVEAE.

I.
HEPATICAE TRIFOL-
IAE CÆRULEAE, PLENO FLORE.



Um Hepatica trifolia in genere à nobis alibi descripta sit, hic duas eius præterea species exhibemus, haud vulgares: vnam pleno flore cyaneo luxuriantem, quæ & Hepatica trifolia cærulea polyanthos dicitur; cuius flos à communidiffert multitudine foliorum, colorisque est cærulei saturatoris; ac Clusio teste, in Hungariæ quibusdam locis frequens provenit; In hac autem nostrâ provinciâ difficiliùs alitur. Alterius verò flos, formâ quidem cum vulgari convenit, sed coloris est omnino nivei, ac transparentis; cuius tamen umbra aliquid purpurei rubedinis videtur continere, filisque in medio ornatur coccineis, è quibus candentes apices veluti vniones dependentes, gratum admodum præbent adspectum.

1
Lat. *Hepatica trifolia caerulea polyanthos*.
Germ. Dubbelen blawen *Hepatica*.

L. *Hepatica trifolia flore niveo*.
Ge. Edel Levecrayt met witte bloemen.



II.

CROCUS VERNVS, CROCUS NEAPOLITA-
FLORE PURPUREO MINORE; NVS, FLORE PURPUREO MAIORE.



Roci flos poëtarum quoque fabulis non ignotus; in quem juvenis perdit
to Smilacis virginis amore incēsus, Ovidio teste, conversus, legitur, hoc
versu: li: 4. Metani:

Et Crocum in paruos versum cum Smilace flores.

Plura eius species: hic verò vernū Crocum latifoliū, purpureū, quantitate
inter se plurimū differentem, expressimus. Prior ferè cū Croco silvestri
violaceo Lobellij convenit: huius flos ex suo involucro, reliquorum modo è brevi caule
prodit, sex folijs violacei ad purpureū tendētis, coloris; quātumvis cauliculi supremitas
vna cum floris initio ad maiorem nigredinē accedat. Posterior autem à loco originis Ne-
apolitanus dictus, florem profert maiorem, & gratiore magis ad spectu illustrem; simili-
ter sex folijs constantem, quorum tres interiores, brevioresque, ab exterioribus blando
veluti amplexu comprahenduntur. In medio stylus aureus exit candidis filis in luteos
nodulos desinentibus circumdatus, non ingratum à se spargens odorem.

L. *Crocus Neapolitanus* flo: purp: major.
 Ge. Saffraen vanden Lente met gro: purp: bloe:

L. *Crocus Vernus purpureus minor.*
 Ge. Saffraen vanden Lēte met kley: purp: bloe:



PSEVDONARCIS: PSEVDONARCIS: PLE-
SVS PLENO FLORE, LVTEVS. NO FLORE, TRIPLICI TVBO PRÆDITO.

Pseudonarcissus multiplex, seu pleno flore luteus, folia porro aut Narcisso vero non multum dissimilia promit; sed ob multitudinem foliorum, in floris medio nullum habet, ceterorum more extantem calicem. Color eius circa margines saturatior est, & radix quoque bulbosa. Alter verò Narcissus hîc expressus ex falsorum genere, simili modo radicem & folia gerit, floremque fert triplici tubo, aurei coloris, & per oras fimbriato visendû, in cuius medio singularis stylus eminet brevior, nec ad tubi extremitatem pertingens: Floret Aprili mēse, & rarò post illud tempus reperitur.

L. *Pseudonarcissus* calice pl: multipl:
colore luteo Dod.:
Ge. Dubbelde geelē Tytloosen.

3

L. *Narcissus* duplice tuba flo: lut: Clus.:
Ge. Narc: met die
dubbel trompet.



IIII

NARCISSVS OMNI- NARCISSVS MAXI-
VM MAXIMVS. MVS DVPLICAT. FOLIIS.

Rarum hoc Narcissi genus, quod in horto suo alit, omnium elegantiarum patronus, Christianus Porretus Pharmacop: Lugdunensis in Batavis; & cui alius in genere suo compar, aut æqualis magnitudine non reperitur, vnde & Gallicum nomen invenit: Folia a. habet sesquipedem alta, incana, satis lata, & ferè carinata. Caulis bipedalis vnicum florem profert, magnum, folijs sex pallidis, aut dilutè flavis, constantem, latis sed mucronatis, cingentibus medium luteum tubum vnciâ longiorem, inferiori parte angustiore, superiore magis patentem, oris crispatus: intermedius stylus croceus, brevis, & sex quasi luteâ farina conspersis apicibus veriùs quàm staminibus, circumdatus. Odor floris non ingratus, sed obscurus.

Alter Narcissus Maximus non valde dissimilis est priori, nisi quod duplicatis folijs, & tubo magis patente ac sinuoso maiore elegantia se spectandum exhibeat.

L. *Narcissus maxi: dupl: folijs.*
Gc. *Grooten dubb:*
Narcisz.

L. *Narcissus omnium maximus.*
G. *Narcissus nonpareille.*



v.
MVSCARI FLORE MVSCARI OBSOLETO
LVTEO, ODORATO. ALBO COLORE DOD.

MVscari genus est Hyacinthi spurij, folia gignens, longa, aliquantulum carinata: caules longos, subinde dodrante altiores, parū firmos: floresque promit à medio sursum versus vndiquaque circa caulem multos, paruos, & cavos, gratissimi odoris, & muscum (vnde & apud Græcos nomen hæc planta invenit) quodammodo referentis: Radicem habet, vti alij Hyacinthi i bulbosam, subruffam, crassioribus fibris, (quæ etiam per hyemen durant) terræ profundius firmissimè: inhærentem. Hic duæ eius exprimuntur species, quarum prior florem fert dilutiùs flavescentem: posterioris verò flos est subalbidus, & obsoleti coloris. In reliquis exiguâ differentia, prope convenire videntur.


L. *Muscari flore luteo.*
I. *Muscio græco.*
Ge. *Weltrickende discade.*

5

L. *Muscari obsoleto, colore Albo. i. dod.*
Ge. *Weißer Muscari.*



HYACINTHVS STEL. HYACINTHVS STEL.
 AQVITAN: FLORE CERVLEO. HISPAN: COLORE NIVEO.



Yacinthus hic stellatus, lilij folio in Aquitaniæ montibus frequēs est, à pastoribus Sarahaig dictus, pecudibus noxius, est sæpe lethalis. Folia habet lata, liliorum candidorum folijs similia; inter quæ prodit caulis pedalis, satis firmus, plures sustmens ex intervallis flores, stellæ in modū expansis sex folijs peditos; violacei ceu cærulei saturatoris coloris, In quorum medio extuberat clypeolus rotundus suis circū ornatus filis: unde prodit semen in siliquis triangularibus, nigrum & crassiusculum, non splendens. Bulbus à Lilij quoque radice non multum abest, sed interdum cortice tegitur nucleis inter se compactis distincto.

Hyacinthus Stellatus Lilij folio Hispanicus qui sequitur, per omnia ferè similis prior, nisi quod folia videantur longiora, & flos planè niveum referat colorem.

L. *Hyacinthus stellatus Aquitanicus caeruleo flore.*
Ge. *Hyacinth van Guienne met*
blawe bloemen.

6.

L. *Hyacinthus Stell. hisp. flo: albo.*
Ge. *Spaensch Hyacinth met*
Witte bloemen.



PRIMVLA VERIS BRI-
TANNICA PLENO FLORE.

PRIMVLA VERIS
GEMINATO FLORE.

Primula veris hortensis Anglica maxima, flore pleno, hîc expressa, folia habet ovali rotunditate, marginibus non-nihil crenatis, varijs venulis rugosa, ad Betonicam accedentia sed maiora, & dilutioris coloris, é quibus caulis oritur medius, tenuis, palmi altitudine, in cuius vertice octo, decé, plures etiam spectantur flores lutei, foliorum multitudine insignes, summis labris denticulati, eâdem quâ hic expressi formâ. Radix fibris plurimis hinc inde se spargit, & terræ firmat. Plurimum a priore differt primula veris gemino flore, quorum alter alteri est innatus, flavi similiter coloris; singuli autem admodû communi Primulæ veris floribus similes sunt: & in Belgij hortis ab amatoribus Naturæ miraculorum, nuper coli summâ curâ, cœpti, mirabili sua formâ haud parum spectantium delectantes oculos. Plantæ folia minus sunt crenata, & pediculi, vnde flores dependent, tenuiores paullo & oblongiores videntur.

L. *Primula veris* Anglica pleno flore.

I. Fior de primavera.

G. Brayes de Cocu doubl.

Ge. Dubb Schluetel-bloemē.


7.

L. *Primula veris* flore gemino.



VIII

AVRICVLA VRSI AVRICVLA VRSI MA-
 FLORE LVTEO. DOD. IOR PURPUREO FLORE.



Vricula vrsi Solidaginis species esse videtur, nec forma multum abest à primulâ Veris, folia ferè habens similia, sed æqualia, nullis venis aut nervis rugosa, crassiuscula, & veluti farinâ conspersa, magis que ad margines crenata, inter quæ caulis prodit rotundus & tenuis, è cuius summitate plures cum suis pediculis prodeunt flosculi, flavi coloris, sed diluti, & ad sulphureum interdum tédentis quinque vel sex incisuris distincti foliorû loco; in medio habentes candidum circulum, filis quibusdam, & interdum etiam stylo exiguo, ornatum. Odor plerisque est suavis & melleus. Flores á sequitur semen inæquale & nigrum suis in folliculis inclusum.

Altera species hîc expressâ, folijs est breviribus, latioribus, & ferè rotundis, nisi quod circa radicem in longum desinant, & minus sint crassi: caulis quoque brevior flores profert, non tot quidem innumero, sed maiores, colore saturo purpureo & quodammodo morum maturû referente, qui tamé paullatim violaceum pulcrè exprimit; circa medium dilutiùs purpurascete, & magis ad candorem accedente: odore quoque vincuntur a prioribus.

L. Auricola vrsi flo: lut.:
Ge. Gele Beeren oor.

8.

L. Auricola vrsi flore violaceo.
Ge. Beeren ohr violbraun.



IX.

CHAMÆIRIS FLORE CHAMÆIRIS PUR-
CÆRVLEO VIOLACEO. PVREO SATVRATO FLORE.



Hamæiris anobis hîc descripta, brevibus latisque folijs prædita est; floremque è caule brevi & nodoso profert folijs omnibus supereminentem, amplum, colore inter cæruleum & violaceum mediò, lineisque obscurioribus egregio sanè Naturæ spectaculo distinctum. Nascitur in hortis, sed rarò nisi plantata. Radices eius sunt geniculatæ, solidæ, supra terram sæpè eminentes, odoratæ, cum tamé flores nullo odore commendètur.

Adiūgitur & altera species Chamæiridis, flore coloris purpurei saturatoris, villosum holosericum purpureum quodammodo referentis, & in expansis tribus maximè folijs enitentis; in quorum foliorum medio, ab inferiore parte assurgit fimbria, ex multis tenuibus, brevibus, luteolis veluti pilis concreta, humani ferè supercilij similitudine: cæterùm formâ alijs Iridibus non valde dissimilis est.

L. Chamæiris colore caeruleo violaceo.
Ge. Leech Lijch met blauw
violette bloemen.


9.

L. Chamæiris colo: purp: satur:
Ge. Leech Lijch.
I. Iride.
G. Iris bastet.



x.

HYACINTHVS ORIEN- HYACINT: LATI-
TALIS LATIFOL: CÆRVLEO VEL FOL: BICAVLIS PALLI-
PVRPVRASCENTE FLORE PRÆDITVS. DO PVRPVREO FLORE.



Yacinthus Orientalis, sic dictus, quod ex Oriente in Italiam primùm al-
latus sit, hîc exprimitur, multis ornatus floribus; quorum color vt pluri-
mùm cæruleus, interdum ad purpureū tendens, nonnunquam etiam pla-
nè niveus est: licet eodem semine prognati sint. Hic Hyacinthus folia ha-
bet vulgaribus pinguiora & latiora, caules crassiores, flores patientiores
maioresque.

Orientalis alter maior flores è caule exhibet vtrimque in circuitu prodeuntes, raro
plures decem numero, colore ex purpurâ pallescente; gemino quoque caule præter morè
reliquorum non sine voluptate spectantium sæpissimè luxuriat.

L. *Hyacinthus orientalis* caeruleus.
I. Iacinto orientale.
Ge. Orientael Hyacinth.

L. *Hyacinthus orientalis* pall. purp.
G. Iacinte orientele.



HYACINT' ORI- HYACINTH: ORIENTAL:
 ENT: CAULE FOLIOSO. SVBVIRESCENTE FLORE GEMIN:



Vm omnes ferè Hyacinthi caulem proferant nudum; prodijt tamen non ante multos annos Hyacinthus hîc expressus, quem Mathæo Caccino Florent: se debere tradit elegantissimus Clusius. Porrò habet iste bulbosam radicem, alijs Hyacinthis Asiaticis parem, exquâ quina vel sena prodeunt folia, viridia, carinata, inter quæ exit caulis nodosus, dodrantalis, cinctus aliquot folijs arctè simul junctis; flores deinde caule incrementũ capiente, explicantur, & nullâ serie servatâ, illum ambire depræhenduntur; cæterùm seriùs & Maio interdum niense prodeunt, jucundâ fæcunditate felices. Eidem Caccino acceptam fert notitiam peregrini huius qui sequitur ac rari Hyacinthi Constantinop: similiter ante paucos primùm annos conspecti, cuius flos initio cum prodit viridis est; deinde subcæruleum colorem contrahit, dum explicari incipit, apertus verò albus est ex viridi; retinentq: omnia eius folia exteriorem illum neruum medium foliũ occupantem, viridem. Petiolus florem sustinens paullo longior est quàm in reliquis Hyacinthis. Quòd a. flori venustatem addit, est alter flosculus tribus folijs constans, è medio flore prorumpens, qui colorem perinde mutat vt primarius flos; medium florem occupant pauca stamina, nigris apicibus prædita.

L. Hyacinthus orientalis caulis: foli:
Ge. Orietaelſchen
Hyacinth.


L. Hyacinth' orientalis ple: flo:
G. Jacinthe orient:
double.



XII.
CORONA IMPERIALIS DVPLICI
CLASSE FLORVM.



Corona Imperialis, peregrina nobis planta, primùm à Clusio Constanti-
nopoly missa, sed origine Persica, quare & ab eodem liliū Persicū dicta,
ex genere silvestrium liliorum; folia habet æqualia oblonga, stellari for-
mâ, caulem instar aliorum liliorum silvestrium, ambiētia; similemque ijs
habet caulem, nisi quod in eius summitate plurium foliorum silvulâ or-
natur, vnde è tenuibus pediculis dependēt flores, sex foliorum, formâ li-
lium exprimentes, sed minores, & magis clausi, nullisq̄ue flexuris crispati, coloris vt plu-
rimùm flavescentis, licet interdum ad rubedinem quoque accedāt: In horum medio ex-
tant sex staminuli, quæ ambiunt stylum candicantem. Et loco radicis bulbum habet ro-
tundum, planum, nec modo cæterorum liliorum nucleis inter se compactis inæqualem,
odoris ingrati. Pluribus quandoque florum ordinibus luxuriare solet: Et quæ hîc expri-
mitur duplici florum classe conspicua est.



Corona Imperialis
classe duplici florum.

XIII.
ANEMONE TENVIFOL.

FLORE VIO- FLORESIM- FLORESANGVI-
LACEO SIMP. PL. COCCINEO. NEO PRINCEPS DICTA.



Nemone .i. venti flos, sic merito suo vocata, quòd nunquam se aperiat nisi vento spirante, mirâ pulchritudine ac varietate colorû amabilis, supra modum delectare oculos ad se spectantiû trahere, & quasi detinere, solet. Hoc verò loco tres Anemones tenuif species exprimuntur, colorum in floribus diversitate, paucissimâ in cæteris differentiâ, distinctæ. Plantæ folia sunt scissa, Ranunculi silvestris vel coriandri folijs proxima; radix cum recentior olivæ iacentis similitudinem præbet, sed annosior ex multis olivis supinis congesta videtur, atque nodosa plurimùm apparet: Flores ex tenuibus ac lanuginosis cauliculis prodeunt, sex plerumq; foliorum, gratissimi aspectus; in quorum medio capita ferè purpurea (quamvis ea non semper vnus sint coloris) suis circumdata staminibus, & apicibus conspiciuntur. Prima species, florem violaceo sive purpureo monstrat colore; Altera Phœniceo; Tertiæ a. speciei flos sanguineum villosum fericeum pannum quàm proximè refert, & ob pulchritudinis excellentiam, Anemone princeps audit.

L. *Anemone coccineo.*



I. G. *Anemone princeps sanguin.*



L. *Anemone tenuifolia violaceo.*
It. *Cocles.*
G. *Coquelourdes.*
Ge. *Kuchenschel.*



XIII.
ANEMONE TENVIFOL.

FLORE PLENO SVAVERV- BYZANTINA FLO-
BENTI CACCINI ALTERA. RE POLYPHILLO.

PRior hæc species Anemones pleno flore non multùm à sequenti Byzanti-
nâ differt: Color floris est in exterioribus folijs is qui Rosæ Alabandicæ
evanescenti esse solet, fundus tamen ex multis minoribus foliolis constas
magis rubre videtur. Posterior Byzantina (alè Turcis dicta) folia habet
Bulbocastani; flos a. decem pluribus, amplioribus ac lanuginosis in circuitu
folijs, exteriùs suaverubentibus, at interius saturatiore colore splendentibus, conspicuus;
cuius medium plura ac pænè infinita tenuia foliola, sanguinei coloris vel etiam dilutè
purpurascens, implent. Radix nodosa & oblongior, colore exteriùs non nigro, sed fuf-
co. Hęc planta aliquoties in Autumno iterum flores producere visa, sed minus elegantes;
quorum media foliola melinùm ac subuiridem, ob caloris (vt puto) defectum, colorè.
tanquam cruda & immatura, retinent.

L. *Anemone tenuifol: plen: flor: coccineo.*

L. *Anemone ten: fol: plen: flor: pallido rubro.*



XV.
ANEMONE TENVIFOL.

VERDVNIA, FLO- HISPAN: FLO- SIMPLEX, FLO-
RE SIMPLICI VIOLACEO. RE CARNEI COLOR. RE ORENGIACO.

IN latifoliarum Anemonum floribus tanta conspicitur colorum varietas, ut verbis exprimere sit valde difficile; variante etiam mirum in modum foliorum quibus constant, numero. Plantæ folia sunt latiora ac paucioribus scissuris divisa; radix quoque tuberosa, & suis fibris cincta. Tres hîc species exprimuntur; prima, Verdunia vulgò à quodam cultore suo in Batavis sic dicta, florem habet septem foliorum, quorum color in violaceum ceu Ianthinum ex argenteo fundo desinit; capitulum lanuginosum nigrescit, ac filis circumdatur candidis subcæruleis apicibus. Secunda, Hispanica, cuius flos carnei (qui vulgò incarnatus dicitur) coloris duodecim vel tredecim foliis, capitulum & stamina in orbem ambientibus, constat: Tertia, florem habet octo foliorum, pulchrè rubeti flavoque colore (quem Belgæ Oregium vocunt) splendidum, cuius capitulum staminula cingunt, cæruleis apicibus ornata.



*L. Anemone latifolia
Verdunia.*



*L. Anemone latifolia hispanica
Carneo colore.*



XVI.
ANEMONE TENVIFOL.

PAVO FLORE SIM- PAVO MAIOR MVL-
PLICI. TIPLEX.



Nemone hortensis latifolia, Pavo secūda dicta, florem gignit simplicem, latioribus folijs in acutum desinentibus septem octo vel pluribus Cocci- nei coloris præditum. Altera verò Anemones species, profert florem, vi- cenis vet tricenis interdum pollicari longitudine, folijs, cuius color Phæ- niceus saturatior, fundo sanguineo in circulum flavescentem circa vmbi- licum (qui lanuginosus, nigricans, staminibus sanguineis in apices cæru- leos exeuntibus, cingitur) desinente Radices harum Anemonum sunt crassiusculæ, no- dosæ, firmæ, fusco exteriùs, albo intùs colore, & multis tenuibus fibris circumdatæ.

L. Anemone pavo flore simplici.

16.


L. Anemone pavo Major.



XVII.
ANEMONE LATIFOL.

CHALCEDON: MAX:
POLYANTHOS.

CHALCEDO-
NICACA CVMENI.



Æc Chalcedonica maxima folia habet ceteris Anemonibus maiora, duriora, & pluribus nervis prædita; florem etiam latum & extensum, multorum foliorum, quorum decem vel duodecim exteriora viridia sunt, venis coccineis intermeantibus, distincta; interiora verò minora & tenuiora, lanthino dilutiore & suave-rubente colore splendentia, quæ circa medium; eundem colorem retinent, reflexa tamen & quodammodo crispata videntur.

Anemone Chalcedonica ex Cacumenis altera, cuius in literis suis meminit nobilis vir Mathæus Caccinus Florentinus, Clusio nominata quidem, sed nondum plenè cognita, saltem necdum descripta; hîc verò expressa, florem fert triplici foliorum ordine eximium, colore non vno, sed flammeo, sanguineo, ac niveo, delectabili admodum mixturæ varietate, fundo item exalbido ornatum, cui pro staminibus angusta quædam sunt foliola crecta mellini coloris medium occupantia.



L. *Anemone latifolia Chalcedonica maxima polyanthos.*



L. *Anemone calcedonica cacumeni.*



XVIII.
ANEMONE TENVIFOL.

FLOS ADONDIS; ERAN- BVPHTHALMVM
THEMVM DOD. DOD.



Erba, quam Eranthemum nuncupat Dodonæus; & Mathiolus non rectè Adonidis florem, cùm iste flos poetarum fabulis notissimus, Anemones species videatur; cauliculos profert à radice plures, in alas subinde divisos, striatos, virètes; folia tenuia, Chamæmeli similia: flores non magnos, formâ Ranunculi florum, pulcros, minij colore rubentes; quos capitulum sequitur oblongum, ex multis collectum feminibus rotundis, acuminatis, colore in viridi subingricantibus: Radices fibrosas.

Stirpi cui Buphthalmo nomen datum, cauliculi è radicibus exeunt tenues, tres quatuor aut plures, pedales vel altiores; circa quos folia virentia, tenuiter dissecta, similitudine foliorum foeniculi, sed multo quàm illius minora; flores in summo cauliculorû magni, calendulæ satis similes, colore flavo, staminibus in medio luteis, post quos capitulû succedit, veluti supra descripti Eranthemî, ex multis feminibus simul congestis commissum: radices tenues sunt & fibrosæ, Veratri nigri radicibus similes.


L. Buphtalmum .
I. Occhio de bue .
G. Oeil de boeuf .
Ge. Genßblum .

L. Eranthemum Dod .
flore sanguineo .
G. Fleur du vent .
Ge. Brunettehens .



XIX.
NARCISSVS TENVIFOL.

FLORE ALBO MEDIO FLORE ALBO ME-
PURPUREO, DOD. DIO LVTEO, LOB.



Narcissus hic medio purpureus (cuius Dioscorides quoque meminisse videtur) folia habet virentia, oblonga, porri folijs similia: caulem nudum angulosum, pede altiorem, & in summo florem è membranâ erumpentem, ut plurimum unicum, subinde etiam geminum, mediocriter amplum, odoratum, ex sex candidis folijs congestum, in quorû medio brevis calix est circinatæ rotunditatis, purpurei per oras coloris, unde purpureus Narcissus tam à Plinio quam Virgilio dicitur intra quem stamina brevia cum apicibus subluteolis: capitula inde angulosa: semen in his nigrum, Radix bulbosa cepæ similis, quæ nucleos à se emittens in multos facile bulbos multiplicatur.

ALTER Narcissus à Lobellio descriptus medio luteus, folia habet ampliora & altiora, caules etiam proceriores & crassiores, non totûdos, sed quodammodo planos, in quibus singulis flores tres aut quatuor prioribus formâ similes, nisi quod hic ex vno atque eodem caule flos tertius geminatis folijs amplior, tubus autem luteus oris crocæis crispatis, appareat. Sed non omittendus hîc videtur elegantissimi Ovidij versus quo admodum venustè hunc Narcissi florem depinxisse videtur in Metamorph: libris.

*Croceum pro corpore florem
Inveniunt, folijs medium cingentibus albis.*

L. *Narcissus medio purpureus* .
I. Narcisso .
G. Narcisse .
Ge. Narcisz .

19 .



L. *Narcissus medio*
luteus .
Ge. Narcisz in't
midden geel .

XX.
NARCISSVS LATIFOL.

FLORE MEDIO LVTEO OBLON-
GIORE CALICE.

Narcissus hîc priori loco expressus in Aprili prodice solet, habetque folia erecta & non-nihil carinata, florem ferè vnicū oblongū ex caule suo satis alto dependentem; cuius folia sex candida, longa, mucronata, in orbem circūdant tubum oblongum flavi coloris, marginibus non-nihil crispatis, in medio stylum habentem plalidulum sex staminibus (quorum apices luteâ quodammodo farinâ conspersi videntur) cinctum. Odor eius non est ingratus.

Alter Narcissus parum à priore differt, folia tamen habet ampliora, carinata saturè vi-
rentia & hyacinthinis folijs non absimilia; flores etiam fert plerūque binos coniunctim
ex vno membranaceo folliculo prodeuntes. Sic nempe ludit in eiusdem generis floribus
iucundâ varietate Natura, quæ sæpè humanâ industriâ adiuta, etiam notos flores insolitâ
veste veluti personatos prodire iubet.

L. Narcissus oblongo calice .

200

*L. Narcissus medius lute^o
amplo cal: clusij.*



XXI.
NARCISSVS TENVIFOL.

PER TOTVM FLOREM FLORE ALBO
CANDIDVS. PLENIOR.



Narcissus per totum florem medio quoque cādidus, hīc describitur; cuius folia oblonga & minus virentia, caulis verò quatuor pluresve flores profert, haud ita, vt reliqui Narcissi flores, magnos, omnino niveos, exiguo ac brevi etiam calice eiusdem coloris. Invenitur in Hispaniā passim.

Narcissus qui sequitur nusquam nisi in hortis reperitur, seriusque Maio nempe mense, prodire solet, folia habens procera & caulem ipsis folijs breviorē, qui florem profert satis magnum, sex latis & carinatis folijs albis stellari formā extantibus, cuius medium loco calicis alia sex minora folia itidem candida nonnihil flavescens coloris hinc inde sparsim monstrantia, occupant; umbilicum nihilominus stamina quedam ornant.

L. *Narcissus totus albidus*.

21

L. *Narcissus flore multiplici*.



XXII.
NARCISSVS LATIFOL.

FLORE PALLIDO, ET MAIOR MEDIO-
AMPLO CALICE FLAVO. LVTEVS.



Radice bulbosâ oblonguisculâ multisque fibris præditâ, hic Narcissus ter-
na aut quaterna promit folia, latiuscula, sesquipedem longa, inter quæ nu-
dus prodit caulis, pedalis longitudinis, summo fastigio sustinens vnū flo-
rem, è membranaceo folliculo emergentem, sex folijs pallidis sive dilutè
admodum flavis, constantem; ex cuius vmbilico calix sive tubus amplior,
oris simbratis, coloris aurei; in quo sex breuiuscula stamina, flavis apici-
bus prædita, & medius stylus staminibus brevior.

Narcissus alter maior in Italiâ frequentior est, & caulem habet cæteris Narcissis longi-
orem multò, adeò vt ad tres interdum pedes assurgat; vnde flores suis ex pediculis depen-
dent plures mellini aut sulphurei, non tamen omnino surdi aut tristioris coloris; habentes
in medio tubum aureum, odoris non insuavis.

L. Narcissus maximus griseus calice flavo.




*L. Narcissus maior
medio lute? Italicus.*

XXIII.
NARCISSVS IUNCIFOL.

FLORE AMPLICI-
LICIS LVT.

FLORE ALBO
REFLEXO.



Vic priori Narcisso folia sunt cæteris angusti: folijs Narcissis similia, & paululum à juncis diversa; inter quæ medius exit caulis gracilis sed firmus, pedali lōgitudine, in cuius summo è membranâ tenui tres vel plures prodeunt flores, elegâtes, odorati, & vulgaribus Iuncifolijs maiores, sex constantes foliolis flavis, in quorum medio calix crocei coloris justo amplior, oris vt videtur plicatis, è quo sex brevia subflava staminula aureis apicibus ornata, eiusdem coloris stylum in nodulum crassiorē desinentem, cingentia emergunt.

Alteri Narcisso ex Iuncifoliorum quoque genere existenti, duo tres vel plures ex membranaceo involucro nascuntur flores deorsum pendentes, nivei, oblongi, sex folijs Cyclamini instar reflexis, extante tubo pollicis longitudine, oris inæqualibus, in quo tria candida staminula subflavis apicibus ornata medium stylum eminentiorem circumstāt; quem sequuntur trigona capitula, semine rotundo, nigro, splendentiq̃ue grāvida. In Pyrenæis montibus frequens invenitur.

L. Narcissus Juncifolius amplo cal:lut:

23

L. Narcissus Juncifolius albo flore reflexo.




NARCISSVS IUNCIFOL.

PLENO FLO- FLORE CALICIS

R E.

MAXIMI.



Radice bulbosâ, rarissima hæc plâta profert quaterna aut quina folia sur-
 recta, lævia, angusta, viridiaque; inter quæ assurgit, caulis rectus, enodis, vi-
 ridis, satisque firmus, summo fastigio sustinens membranaceum quoddam
 involucrium, ut reliqui Narcissi, è quo plures interdum flores, oblongius-
 culo gracilique pediculo inherentes, & multiplici foliorum texturâ con-
 stantes, exiliunt, quorum florum color prorsus aureus, & forma omnino
 diversa à vulgari florum formâ; ut qui longiore illo tubo carent, & statim ab extremo pe-
 diculo confertim oriuntur, ut quoque in Anemones latifoliæ pleno flore, eleganti sanè spec-
 taculo, videre licet. Nullum à. semen ferre creditur, quod nodo illo careat, qui sub flore
 in vulgari conspicitur, sed adnatis eius propagationem fieri, putat Clusius, unde & ma-
 ior raritas, & magno admodum si qui eam plantam possident meritò æstimant.

Alter Narcissus ex genere quoque Iuncifoliorum maior, flores producit ex vno invo-
 lucro satis amplos, flavi coloris, tubo maximo luteo, circa oras crenatas patentiore; præ-
 ditos; in reliquis cum alijs Narcissis angustifolijs convenire videtur.

L. Narcissus Iuncifolius flore pleno.

.24..

L. Narcissus maximo cal flo: lut.



XXV.
LILIVM PERSICVM.




Illium hoc Persicum vel Susianum inter exoticas & peregrinas omnio plantas referendum, nec valdè frequens est, sed tatum in cultioribus hortis invenitur; à Dodonæo Pseudohyacinthorum numero habitum, folia profert oblonga, subviridia, minus cæterorum liliorum folijs lata, inferiorem caulis partē occupātia, qui quidem caulis rectus rotundus ad tres quatuor pluresuè pedes in altitudinem assurgit, cuius fastigiū magno florum ex pediculis nunc longioribus nunc brevioribus pendentium numero vestitur ac ornatur. Flores a. ex quinque aut sex foliolis constantes, nolæ pendentis formam referunt, & violæ nigræ colorem proximè exprimunt, ad purpureum tamen interdum magis accedentes: nec simul sed paulatim, & suo quodam ordine, ab inferiore nempe parte incipiēdo se pandunt, odore prorsus carentes. Radix, bulbo constat magno, partim rotūdo, partim plano, fibris subflavis in sessili parte terræ inhærente.



Sium Persicum.

XXVI.
TULIPA LATIFOL. PRÆCOX.

PURPUREO ALBO FLORE EX PURPV-
FLORE. FLORE. RA RUBENTI, ORIS ALBIS.

 X Bulbosum florum numero & Tulipa est, flos peregrinus; cuius differētes sunt species maximâ colorum varietate luxuriantes. Maioribus ferè eadem omnibus forma est; folia eis bina aut terna, crassa, oblonga, lata, per oras subinde modicè reflexa, quæ cùm primùm erumpunt, modicè rubere vidētur, adulta verò albicant: caulis inter ea exit pedalis, aut paulo altior; cui vnicus flos insidet sursum spectans, è senis foliolis, patenti profundiori & aliquātulum angustioris oris cyatho, aut inverso huius formæ pileo quodammodo similis; qui ferè inodorus est. Semen cartilagosum, planum, in capitulis nascitur, quæ maturato femine in tres dehiscunt partes. Radix bulbosa est, à Narcissi bulbis parum distans. Hic tres flores coloribus differentes, exprimuntur; quorum primus, purpureo violæ colore, non tamen æquali, sed multâ varietate differente, vestitur; secundus frigioris omnium impatientissimus, albus est, roseis licet interdum aut purpureis lineis aut venis intercurrentibus ornetur: tertius, phæniceo ferè est colore, ad purpureum nonnihil tendēte, vnguibus ac oris albescentibus spectabilis, qualem nuper in cultissimo Wolfwinckelij horto summâ delectatione vidimus.

L. Tulipa praecox flore purpureo.

26.

*L. Tulipa praecox wolfswinckel flor: purp:
et marg: albo.*

L. Tulipa praecox flore albo.



TULIPA.

PERSICA

PRÆCOX.

CRETENSIS

LILYFOL.



Um præcoribus Tulipis florem dedit planta Tulipæ Persicæ, cl: Clusio ab illustri Caccino missa, quæ pedalis longitudinis caulem anno 1607. protulit, satis gracilem, quatuor præditum folijs, non valde latis, imò Narbonensis Tulipæ foliorum latitudinem haud superantibus, non adeò tamen virentibus, sed ad præcocæum Tuliparum colorem magis accedentibus, ac carinatis: qui caulis supremâ parte florem sustinebat delicatulum, Hispanicæ Tulipæ flore paullò maiorem, sex folijs binas vncias longis constantem, quorum tria longiuscula & mucronata, foris quidem suave-rubentis coloris, oris tamen albis, internè verò prorsus albis: tria a. interiora folia, quæ aliquantulum breviorâ, mucronem habebant non-nihil orbiculatum, niveique planè erant candoris: omnium nihilominus vngues purpureâ maculâ iusigniti: stamina nigra, apices etiam nigri; Bulbi cortex foris nigricans & fuscus, interiore parte molli lanugine ferruginei quodammodo coloris, obsitus. Huius nostri floris folia pleraque omnia mucronata sunt, & parum formâ inter se differre videntur.

Altera, ex Cretâ vt creditur, primùm allata, inde nomen accedit; folijs est lilij latioribus, florem quoque fert patentem, formâ lilij, candidi ac purpurei coloris elegantissimâ mixturâ, croceo item fundo, ac staminibus nigricantibus, non ingrato spectaculo, visendum.



L. Tulipa Persica.

L. Tulipa Candia.

XXVIII.
TULIPA TENVIFOL.

PUMILIO.

NARBONENSIS.



Tulipa pumila, ex ijs que angustioribus folijs prædita sunt, minima est, paucis cognita, & à nemine quod sciam, hætenus descripta, nisi quod pumilionis Tulipæ meminerit tantùm appendix Dodon: flosculus est colore subflavescente decorus; virgulis insuper rubicundis, venulis etiam ac vnguibus miniatis ornatus, ceterùm formâ suâ à Narbonensibus non multùm abest. Adiuncta est altera Narbonensis, vel Bononiensis dicta; quæ & Apenninea à Clusio appellatur; hæc caulem profert sesquipedem altiorem, in plures aliquando ramulos divisum; ex quibus singulis flos flavi aureique coloris patentior oritur, cuius folia fatis lata sunt, & foris maximè circa fundum, virescunt; ex floris autem umbilico capitulum procedit longiusculum; trigonum, nonnullis flavis staminibus circumdatum; odor hiuc exit non ingratus, qualis ferè luteo Leucoio esse solet. Radix bulbosa est, eius, cuius Castaneæ nucleus coloris; quæ facile in plures bulbos multiplicatur.



1. *Tulipa Bononiensis.*
6. *Tulipa de Montpeliers.*




Tulipa pumilus.



XXIX.
TULIPA. LATIF.

DUCALIS CRO- PRÆCOX, ALBO FLORE,
CEO SANGVI- LVTEO CARNEI COLO-
NEO FLORE, FLORE, RIS MARGINIB:



X latifolij Tulipis tres species colorum differentiâ insignes, hîc spectantur; quarum primæ flos ex ducalibus vulgò dictis, suavissimi odoris; colore in foliorum medio sanguineo, oris sive marginibus croceis, elegantissimè spectaculo, egregius: Secundæ oblongior lutei splendidi est coloris, ex præcocium genere: Tertiæ verò flos amplissimâ est formâ, colore albo, carneis ac purpurissis lineis passim circa margines intercurrentibus, variegatus.



xxx.
TVLIPA LATIFOL.

FLORE SAN- FLORE MINIATO FLAM:
GVINENEO. CANDICAN: VARIO.

Rior Tulipa, ex latifolijs plantis est, amplo flore, sanguinei coloris vniformiter splendidi, neruis venisque saturatoribus eleganter ornato, illustris; cui proximus Tulipæ flos, in horto Michaelis Semmij nuper prognatus, oblongior est, miniato circa oras passim colore, flammis candicantibus per medium eleganter & multifariè, admirando Naturæ miraculo, inter-
finitus.

30.

L. Tulipa cinnab: et alb: flamm.



L. Tulipa sanguin:.



XXXI.
TULIPA LATIFOL.

FLORE COCCI- ALBO FLO- ALBO FLORE,
NEI. ALBIQ: ELEGAN- RE CRENATO, COCCINEIS LINE-
TER DISTINCTI COLORIS. COCCINEIS FLAMMIS. IS AC FLAMMIS VARIO.



Rimus hic Tulipæ flos, à cultore suo, Honesti nomine florum amatoribus in Bataviâ notus, cuius præcipuè curâ ad tãtam spectaculi excellẽtiam pervenit; colore est argenteo, varijs, nunc tenuioribus nũc verò latioribus lineis intercurrentibus, & infinitis Coccinei coloris puncturis, admirabilis, licet flavi interdum aliquid maximè circa fundum, admittat. Qui sequitur elegantissimus est flos, magnitudine quidem priori cædens, non tamen minore admiratione dignus, cùm singula eius folia candida in medio à summo ad imum tẽniâ latâ coccinei coloris distincta, & flãmulis vtrimque minoribus variegata sint oris non-nihil crenatis aut leviter incis. Postremo loco positus flos patẽtior est, coccineo alboque passim commixte lineatim colore, flammulis intercurfantibus, & stylo subflavescente, conspicuus.

L. Tulipa Honestæ.

L. Tulipa alba coccineis flammis.



L. Tulipa nivea cocc: col: satur :



TULIPA. LATIÆ. PALTON DICTA.


FLORE ALBO, SVLPHV-
REO, COCCINEO, COL:
DISTINCTO.

FLORE ALBO
PHÆNICEO, AD FVN-
DVM SVLPHVREO DISTIN. COL.



Vlparum tanta quotannis varietas, vt cultorum suorum sæpissimè vota, vel eludat, vel superet, adeoque verbis vllis exprimere etiam exercitato difficillimum sit.

At flammea hæc prior Tulipa merito dici posset, cuius flos totus flammis sulphurei flavi ac Coccinei coloris distinctus, splendescit: quamvis n. in fundo fere flavescat, ad suprema tamen foliorú latioribus phœnicij saturatoris coloris flammis nitescit. Alterius verò flos elegantiam nequam suo compari cedit, minus flavescit, sed subalbidi coloris radijs lucidior eminet, & spectantium tãdem oculos invitos à se demittit.



XXXIII.
FRITILIARIA,

ALBO FLORE
P V R O.


P V R P V R E O F L O R E
P V N C T A T O.

M Eleagris hæc planta quoque ab ave Meleagride, cuius plumas flos huius imitatur, dicta est, & Narcissus Caperonius, ab inventore; ex liliorum esse genere videtur. Huic priori cauliculus pedalis est, & interdum longior, rotundus, gracilis, firmus tamē, cavus, coloris ex purpurâ virescentis, sed obscurioris, quem sena vel plura inæquali serie ambiunt folia, brevia, angusta, nonnihil carinata; summo autem fastigio sustinet flores geminos, nutantas, nolæ vel tintinabuli instar pendulos; quorum singuli sex constant folijs, rectis, candidi coloris, circa mucronem ex viridi paululum flavescens; è floris umbilico sena prodeunt stamina alba, flavis apicibus prædita, mediusque stylus itidem albus, longior, & extremâ parte trifidus, odore nullo.

Posterioris verò flos purpureus est, foris dilucioribus maculis admodum eleganter & distinctè compositis, ornatus, internè autem non minùs nigris strijs lineolisque aptè intercurrentibus, delectabilis; in cuius medio oriuntur sex staminula subflava, cum stylo eiusdem coloris. Radix ex bulbo quoque porraceo constat, subrotundo; candido.


L. Fritillaria flo: albo.

*L. Fritillaria flore
purpureo.*



XXXIII.
FRITILLARIA,

FLORE LVTEO MACVLIS MAXIMA, PVR-
SANGVINEIS NOTATO. PVREO FLORE, POLYAN:



Fritillaria, quæ hîc prior exprimitur, florem fert sanè jucundâ colorum & macularum mixturâ insignem; cuius folia aurea, elegantibus sanguineis maculis, apto ordine, distinctis, conspersa, mirum quantum spectantium oculos detineant; habentque insuper foris extantes per medium nervos subvirides, suam etiam flori addentes gratiam.

Altera quæ sequitur, Fritillaria maxima dicta, florum numero admodum fœcunda est; nec tamen suâ destituitur elegantia, cum purpureus in singulis color, retium formam exprimere, jucundâ nunc saturitate, nunc dilutissimâ coloris differentiâ, videatur.

*L. Fritillaria flore
luteo.*



*L. Fritillaria' maxin:
polyanthos.*



XXXV.
ORNITHOGALVM.

MINVS.

MAIUS.



Eucanthemo bulbo, (sic & Ornithogalon dicitur) folia multa sunt; & angusta, graminis minora caulis inter hæc exit do-
drâte minor, rotûdus, glaber, absque folijs: flores in summo
è ramulis dispersi emicant sex aut septem, foris herbacei vi-
roris, intus candidi, ex sex foliolis cõmissi, exiguis lilijs, præ-
sertim prius quàm aperiuntur, similes, qui Sole quidem splé-
dente patent, noctu verò, & cum aër nubilus, etiam interdiu
reclusi permanent: capitula succedunt triangularia, in quibus
semé exguum: radix bulbosa, lento succo plena. Duo hîc sunt
expressæ eius species, magnitudine differentes; prior, jam de-
scriptus, minor est: altera, Ornithogalum maius, & lilium quoque Alexandrinum dici-
tur; habetque omnia vt folia, caulem, flores, bulbum, maiora cæterùm ferè similia.

L. Ornithogalum minus.

L. Ornithogalum maius.



XXXVI.
ASPHODILVS,

MAIOR ALBO
FLORE.

FLORE LV-
TEO.

Rimum Asphodili genus, hastula regia quoque dictum, folia habet complura, oblonga, angusta, porri folijs similia, acuminata; caulem rotundum lævem, cubito longiorem; quem à medio sursum versus multi quin que vel sex foliolorum flores patentes exornant, colore candidi, aut ex valde diluto rubro modice purpurascens, staminibus in medio; post quos capitula sequuntur orbiculata: semen in his durum triangulum nigricantis obsoleti coloris; radices ab vno capite complures exeunt, oblongæ, inferiore sede crassiores, magnis glâdibus quodammodo similes. In Gallie Provinciâ, Italiâ Hispaniâ, spontè nascitur: apud Germ: & Belgas, non nisi satus provenit.

Cæterum Asphodelo luteo folia sunt oblonga, striata, in virore quasi cærulea, longiora & angustiora quàm primi: caulis rotundus, cubitalis: flores in eo, à medio sursum versus quoque plurimi; alterius satis similes, sed colore lutei: radices similiter complures; sed multo quam primi & tenuiores & longiores, colore luteolæ, supra quas fibræ quædam laterales exeunt, per quas in plures alias stirps ipsa facilè multiplicatur.

I. Sphodochus albus maior*I. Sphodochus
luteus.*

XXXVII.

AQVILINA, PLENO FLO- AQVILEIA STELLA-
RE ROSEO, PURPVREI COLORIS. TO PURPVREO FLORE.



Quileia folia fert Chelidonij maioris, paulò tamen rotundiora, per am-
bitum incisa, colore in virore cærulea; sicca: caulem verò cubitalem, te-
nuem, rubentem, & leniter hirsutum; cuius alæ singulos proferunt flores,
ex pluribus dependentibus, concavis veluti corniculis, & totidem inter-
medijs sursum erectis parvis foliolis, commissos; formâ aliquomodo ro-
sam multiplicem exprimentes, colore ex rubro purpureo pleno, erum-
pentibus è medio staminibus, à quibus parvi apices dependent: semen inde in siliquis
nonnullis coniunctis paruum, nigrum & spensens nascitur: radices subsunt crasse; fibro-
sæ, quæ pluribus annis durant.

Altera Aquileiæ species, flores gignit paulò maiores, stellatos, multiplici etiam foli-
orum ordine conspicuos, purpureos; cætera prioribus propemodum similes.


L. Aquilina rosea flo.:
G. Ancoiles .

37.

L. Aquilegia flo. stell.:
G. Akeleyen .



FLORE SIMPLI- FLORE PLENO SANGVI-
 CI SANGVINEO. NEO GEMINATO.



BAtrachion Latinè Ranūculus, quod locis fortasse humidis & marginibus ranarum instar gaudeat, dicitur. At hīc duo Ranūculi Asiatici, vnus simplici, alter gemino pleno flore exprimuntur; folia habentes initio terna aut quaterna, longis pediculis innixa, per oras incisa, & in tres lacinas diuisa, dilutius virentia: inter quæ exilit caulis satis firmus folijs in tenuiores & frequentiores lacinas diuisis præditus; summo verò cauli prioris insidet flos satis amplus, sex pluriūve foliorū simplici serie constans, orbiculato mucrone sese mutuò contingentium, sanguinei omnino coloris, foris tamen magis saturè internè lætius rubescentis; medius flos occupatur capitulo satis magno ac nigrescente: Radix alijs propaginibus grumosis augetur, vnde & bulbuli adnati feminis vicem supplere creduntur:

Alterius Ranunculi flos plenus eiusdem coloris, adè multiplicatis folijs conspicuus, vt centissimum foliorum numerum longè superasse repertus sit, & quod mirum, ex floris medio alium tenuem cauliculum profert simili quamvis minore flosculo sæcundū.

L. Ranunculus Asi. simpl.
Ge. Hanenvoet




L. Ranunculus Grunc. dupl.
G. Bassinets.



XXXIX.
RANUNCVLVS,

MAIOR; FLORE
ALBO PLENO.

MAXIMVS FLORE LV-
TEO GLOBOSO.



Anunculus albus multiplex, vel niveus polyāthos à flore dictus, in Belgij hortis frequens est, ab alijs Ranunculis parum differens, montano autem quarto valde similis, nisi quod florum magnitudine & elegantia prestare videatur.

Alter Ranunculus, qui quod alios magnitudine longè superet maximus dicitur; Gesnero etiam Trollius flos, Aconiti species esse quibusdam videtur, quia in siliquis nonnullis simul junctis semen nigrum ferat; quod tamen non placet Dodoneo qui Ranunculorum numero habendum censet. Flores eius aurei sunt, reliquis Ranunculi floribus maiores, globosi, & ex pluribus folijs conglomeratis ac semiclausis brassicæ capitatæ instar, qui nunquam planè se pandunt, constantes.

L. Ranunculus albus flore pleno.

39.

L. Ranunculus flore globoso maxi.



XL.
SATYRIVM BASIL.

M A S.

F O E M I N A.

Maius Satyrion basilicon, quod marem appellant, folia habet oblonga, lata & lævia, lilij folijs minora, paucis & vix apparentibus maculis respersa: caules pedales vel altiores, non absque adnatis folijs, flores in summo spicatos albos, exiguis punctis purpureis notatos, forma testiculi morionis maris, nisi quod ipsis crista desit. Sub quibus singula acuminata nascuntur foliola: radices geminæ veluti palmæ sunt, singulæ in quatuor digitos distributæ, quarum vna flaccidior & quasi fungosa altera vegeta ac solida, paucis ab annexu exeuntibus fibris.

Alterum maius genus quod sæminam vocat, priori minus, folia eiusdem formæ promittit, sed minora, & multis nigris maculis conspersa: flores cucullis similes, cristatos & hiantes, vti testiculi Morionis; colore ex Coccineo rubentes ex purpurâ nigrescentibus lineolis ac punctis variegatos.

L. Satyrion Basilicum fœmina .
Ge. Handchenskruyt .



L. Satyrion Basil mas .
Ge. Creutzblum .



XLI.
NARSISSVS IUNCIFOL.

MAIOR.

MINOR.



Iuncifolio Narcisso maiori (Hispani à similitudine quam folia cum juncis habent Ionquillas vocant.) folia sunt oblonga angusta, crassa interim propemodum rotunda, admodum lævia & flexibilia, à juncis non multum distantia; inter quæ medius exit caulis; in summo cuius flosculi tres vel plures odorati, Narcissis formâ similes verùm minores, & colore per totum florem lutei: radix bulbosa, candida, tenui membranâ integitur. Nascitur plerisque Hispaniæ locis sua spontè. In Belgio Aprili mense florem promit; Et Martio si Hyems clemens fuerit.

Iuncifolius minor in omnibus ferè maiori similis, præterquam quod sit minor, foliaque habeat rotundiora, & numero plura; flores quoque ferat pauciores, & rari plures quàm vnum ab vno pediculo pendentes.

L. Narcissus Juncifol. maior.

41

L. Narcissus Juncifol. minor.



ÆSTAS

HORTI FLORIDI.

INQVA PRÆCIPVI AESTA-
TIS FLORES EXCELLENTI
CR. PASSÆI STYLO ADVIVVM AD-

MODVM INGENIOS EXPRIMVNTVR.



VLTRAIECTI.

Ex Officina Hermanni Borculoi.

ET

Prostant apud Ioannem Ianfonium Bibliopolam Arnemiensis.

Index ÆSTIVVS.
Vcl secundæ partis Horti Floridi.

R <i>Æonia femina, mas.</i>	Fol. 1.	<i>rus.</i>	Fol. 11.
<i>Iris maior Dodonæi.</i>	Fol. 2.	<i>Rosa pleno flore albo, & R: rubra Prænestina.</i>	
<i>Iris Susiana.</i>	Fol. 3.		Fol. 12.
<i>Iris Angustifol: Clusij.</i>	Fol. 4.	<i>Rosa centifol: Bat: & Rosa versicol: Fl:</i>	Fol. 13.
<i>Sisynrichium maius, & Iris bulb:</i>	Fol. 5.	<i>Campanula Flore cærul: & Campan: flo. albo.</i>	Fol. 14.
<i>latif: Clusij.</i>	Fol. 6.	<i>Papaver, flore pleno.</i>	Fol. 15.
<i>Iris flore lut: & Iris Hispanica.</i>	Fol. 7.	<i>Lychnis Coron: fl: rubro pleno, & L flore albo.</i>	Fol. 16.
<i>Moly mont: latif: flavo fl: Moly angustifol.</i>	Fol. 8.	<i>Caryophylleus flos minor, vel Superba.</i>	Fol. 17.
<i>Lilium montanum.</i>	Fol. 9.	<i>Caryophyll: flore albo punct: fl: sanguineo, fl: niveo.</i>	Fol. 18.
<i>Lil: Martagon Pomponij.</i>	Fol. 10.		
<i>Lilium Rubrum Bulbi ferum.</i>		<i>Melanthium sativum, & M. pleno flore.</i>	Fol. 19.
<i>Gladiolus Narbon: & Gladiolus vtrinq: florise=</i>			

ANAGRAMME

Du nom de bauteur.

Sur son liure de rares Fleurs.

CRISPIAN DE PASE.

PRIS DE SAPIANCE.


Timante en peignent son enorme Cyclope.

Apelles sa Venus, Zeuxe sa Penelope.

Nont aquis tel renom par leur divine science.

Que DE PASE en ses Fleurs qu'a le PRIS DE SAPIANCE.

Iacques Chicze. Orangeois.



Meridies

Occidens

Orientis

Septentrio

^{I.}
PAEONIA.

FÆMINA MAXIMA.

Pæonia à Pæone inventore dicta, à Græcis Glycisida, quod grana mali punici granis similia habere videatur: huius fæminæ caules, secus ac maris, parum aut nihil rubent; folia incondita, hippofelini, quod à Theophrasto Smyrnion appellatur, ferè modo laciniata, & singularia angustiora quàm maris, supernâ parte virentiora, inferiore albicantiora: flores sunt maximi ex purpurâ splendide rubescentes, & tanto quandòque foliorum numero luxuriantes, ut ducenta plura in suo ambitu contineant folia: semè in filiquis Amigdalis similibus nigrum, rotundum; & grana quædam coccineo colore minus tamen quàm masculæ Pæoniæ splendentia: radices ab vno capite multæ descendunt glandulosæ, veri Asphodeli radicibus similes, sed multò crassiores & lōgiore; à quibus sæpè aliæ duæ aut tres procedunt, eiusdem omnino formæ. Floret Maio mense, hortorum ornamentum.




P. *foem: maxim:*

33

1

IRIS MAIOR

DODONEI.



Ris dicta ab cælestis arcus similitudine, quem flores eius referunt, non tantum colore, sed & magnitudine differentes species profert. Folia maioribus sunt oblonga, gladijs similia: caules rotundi, læves, cubitales, nonnullis altiores; in quorum summo flores alterno ordine positi, terni quaterniue, odorati; constantes senis potissimum foliolis, quorum tria deorsum repanda arcus modo reflectuntur; inferiore parte pallentia, superiore verò pulcherrimum nigræ violæ colorem proximè exprimentia, intermixtis interrim lineis candidis ab ipsâ flavâ fimbriâ exorientibus; alia tria sursum & contra se mutuo curvantur, diluioris coloris. Oritur fimbria ab ipsâ foliorum in singulis floribus parte, quâ calyci in-hærent, & inde sursum ad medium producitur, multis, tenuibus, brevibus, luteolis veluti pilis, Ericæ hirsutæ formâ. Præter sex a. hæc quæ propriè folia, sunt & tria alia oblonga, angusta foliola, extremâ summâque parte bifida, quæ fimbriam illam quodammodo contegunt: sub his singula stamina. Radices Iridi subiacent oblongæ, solidæ, geniculatę digitali crassitudine, subinde in plures propagines distributæ.



I. Iris maion
I. Giglio
G. Glacyul
Ge. Lisch.

IRIS ^{3.} SVSIANA:

IRIS hæc ex Latifolijs Iridibus vna, ad nos è Byzátio primùm allata, Tur-
cis Alaga Sufam dicta, quòd circa Sufam Persiæ urbem frequens nasci
credatur, folia habet sex vel octo Lusitanicæ Iridis bifloræ folijs similia;
caulem verò sesquipédalem vel altiorem, rotundū, nodosum è quo flos
oritur cæteris Iridis floribus maior ex novem quoque folijs factus; quo-
rum tria reflexa crassa sunt subnigra ex purpurâ subalbescensibus venu-
lis distincta, & pilis nigris tecta, maculâ insuper nigrâ holo sericum eiusdem coloris ex-
primens pannum, resperfa; tria his incumbencia folia dilutiùs nigrescūt, & veluti ex ni-
gro purpnrascunt: tria verò eminentia lata sunt admodum & tenuia infinitis partim ci-
nericei coloris lineolis ac strijs intercurrentibus, varia, ita vt Pavonis Americani caudã
extensam aliquo modo exprimere videantur. Hic flos coloris causa in pretio est, cum
omnino nullum habeat odorem; & planta quod frigoris sit impatientior floret rariùs,
& plures præter vnum florem vix vnquam simul protulisse apud nos visa est.



*L. Iris Sylviana
maior.*

Wink P. K.

4.
IRIS ANGVSTI-
FOLIA CLVSII.

HÆC Iris angustifolia, non malè Pannonica versicolor dici posset, cùm in Hungariâ & Austria superiore frequens sit. Et nulli Iridium elegantia cedat. Habet autem folia sequipede altiora, admodum angusta, nec digiti minimi latitudinem excedentia, in acutum desinètia viridia, at circa terram nonnihil purpurascètia, odoris haud nigrati. Caules ad tres quandoque pedes assurgunt, rotundi, firmi, cavi, geniculati, circa superiores partes in duos tresve ramulos divisi, ex quibus prodeunt flores ab Iridum bulbosarum latif: Versicoloribus floribus non multùm distantes, boni odoris; quorum tria deorsum reflexa folia, colorem inferus monstrant fuscum, superiùs violaceum, lineolis ac venis saturatè purpureis intercurrentibus delectabilis, absque fimbria cuius loco linea succedit lutea; tria verò quæ erecta consistunt non adeo contra se recurvantur & minus lata sunt colore cæruleo saturato vel purpureo decora. Radices quoq: obliquæ nodosæ & sibi invicem implicitæ, multas tenues fibras inferius demittuntq:

Iris angustifolia
Clusij.

4



SISYNRICHIVM
MAIVS.

IRIS BVLBOSA
LATIFOL.



Sisynrichium maius oblongis angustisque folijs, mollioribus quàm Iridis bulbosæ folia, & ad Hyacinthi botryodis quàm proximè accedentibus, striatis, viridibus, & humi plerumque fufis, præditum; rotūdo item dodrantali striato firmoque caule, qui ex multis involucris tanquam è vaginulis flores promit quaternos aut quinos, alternatim prodeūtes; vt primo marcescente alter succedat, deinde tertius, & sic deinceps, Xyridis potūis florem quàm Iridis referentes, ex novem foliolis compositos; quorū tria deorsum inflexa, pro fimbriâ luteam maculam habēt; alia tria sursum aliquantulum attolluntur; tria verò reliqua, quæ in alijs ligulam tegere solent surrecta, summâ parte divisa; & bifida. Est autem totus flos pulcher aspectu, coloris præter maculas illas cærulei; odore quidem prætanti, sed admodum fugaci. Semen rotundum & subruffum tenui admodum membranâ continetur Radix bulbosa est atque gemina.

Iris bulbosa latifolia à Cluſto perinde ac à Dodonæo descripta, folia habet lata, lilij non bulbosi folijs similia, mollia, melini coloris; inter quæ cauliculus exit brevis, in quo oritur flos formâ reliquarum Iridium bulbosarum, grati odoris, ex cæruleo colore aliquando subalbescens; qui cum evanuerit, alij vtriusque emergūt bini; Radix cepæ similis, dulcis est saporis, varijs nigricantibus contacta corticibus.

L. Iris Bulbosa latif: Clusy.

*L. Syfyrichium
maius.*



6.
IRIS BVLBOSA.

FLORE LVTEO

HISPANICA.



Æc Iris bulbosa prior folia habet quaterna aut quina oblonga, angusta, striata, Asphodeli lutei satis similia, superiore parte cava, inferiore verò prominentia ac subrotunda: caulem cubitalem: florem in summo lutei elegantis coloris, è senis maioribus, & tribus minoribus foliolis constātem; cui oblonga crassa veluti siliqua succedit, in quā semen. Radix bulbosa, oblonga, subruffā integitur membranâ, quę vbi florem facit in duos bulbos abit, ipso caule ex imo & ex bulbi fibris assurgentē.

Hispanica formâ parum a. præcedente differt: deorsum etenim folia reflexa candidant; assurgentia verò caruleum colorem referunt: angustiora sive minorâ inferioribus ita incumbunt, vt necdum stamina aut apices cerni non queant, sed ipsis etiam adhære-
re appareant; quę & extremis partibus fissa sunt atque reflexa.

L. Iris bulbiflora luteo. .6.



L. Iris Hispanica bulb.



MOLY MONTAN:

LATIFOL: FLORE FLAVO.

ANGUSTIFOLIUM.



Moly latifolium a latis, crassis, pinguibus, carinatis, & erectis folijs sic dictum, quæ non multum a Scyllæ folijs differunt, coloremq; porri imitantur: hujus caulis pedalis est, viridis, ex tenui in summi duplici membranulâ triginta plures proferens flosculos suis in pediculis tenuibus quidem sex satis firmis eminentes; qui singuli ex sex foliolis stellari formâ compositis externè pallidis internè verò luteis constant in cuius medio stylus extat trafidus sex flavis staminibus in apices in eiusdem coloris desinentibus cinctus. Radix porro similis bulbosa est & sæpè gemina.

Moly alterum hic expressum angustifolium a folijs angustioribus & quodammodo juncinis dictum, flosculos promit pediculis dependentes priori similes, sed candidos, putpureis subinde venulis elegantior distinctos.

L. Moly latifolium mont: flore flavo.

7.

L. Moly montan: angustifolium.




LILIVM MONTANVM.



Ilvestre lilium montanum dictum, caules promit bicubitales aut altiores, rotundos folia longa, lata, acuminata, non supra invicem incerto ordine disposita, sed caulem quibusdam locis, stelle modo radiate, circundantia: flores e suis pediculis deorsum dependent, Liliij diuisurâ, sed minores, colore purpureo obsoleto, purpureusque aliquot maculis splendentes, & staminibus eiusdem coloris in medio; quorum foliola retrorsum reflexa in circulum feru recurvantur: Radices bulbosæ veluti ex multis nucleis conjunctæ, aurei vel flavi coloris (vnde & Galli totam plantam liliij flavi nomine vocarunt) ex quibus fibre dependent.

Nasertur complurimis Germaniæ locis in silvis & montibus Fuschia & Gesnero testibus Belgæ cum alijs lilijs in hortis habent. Eloret sub initium Iunii candida lilia antevertens.



L. Lilium nouarrum.
I. Githo fabarico.
G. Ins jaurice.
Ge. Cymbels.

MARTAGON^{9.} POMPONII.



lilium, Martagon Pomponij ab ijs qui diu aluerunt vocatum, quâ etiam appellatione ex Italia se ijdē accepisse asserūt, rarū adhuc est in his provincijs, quia adnatis difficillimè se propagat, nec apud quempiâ ipsam plantam semen præbuisse cognitum est, præterquàm quòd Clusius in appendice, se decem vel duodecim semina solida, plana, orbiculata, parua, subrubentia, circa annum 1606. in siliquis sextuplici ferie connexis invenisse, tradat. Est autem hoc lilium ex silvestribus, caulem promens sesquipedē altiore plurimis oblongis angustisque confuso ordine folijs cinctum; in cuius superiore parte flores alternatim ex suis pediculis prodeūt, crocei admodum saturati vel miniati coloris, quorum foliola retrorsum reflexa in orbem ferè recurvantur. Radix bulbosa est, At demū Florū sobole admodum fæcunda hæc planta est, adeo vt trigesimum sextum numerum attigisse vel superasse, referatur.



9.

L. Martagon Tomponicum.

Willm. B. N.

LILIVM RVBRVM BVLBIFERVM



Ilium hoc rubrum sive purpureū ex maioribus esse videtur,
 caulem habens procerum, & folia Lilij albi folijs similia, sed
 nigriora & angustiora circa caulem multa, sed āte eius exor-
 tum nulla: flores summo caule plures supra invicem incerto
 ordine digestos, candidi quidem lilij formâ, colore verò ru-
 bro ad croceum inclinante; multis exiguis, nigris quasi punc-
 tulis, literarum quarundam veluti rudimentis resperfos; ra-
 dices bulbi magni sunt, ex multis nucleis compositi, vt can-
 didi lilij, sed maiores.



L. Lilium rubrum bulbiferum.

I. Giglio rosso.


G. Lis orangé.

Ge. Roode Iclien, ofte Gold gilyen.

GLADIOLVS,

NARBONENSIS.

VTRIMQUE FLORIFERVS.



Ladiolo folia sunt oblonga, angusta, striata, gladij modo mucronata, iridis minora & angustiora: caulis lævis, teres, cubito longior; circa cuius summum flores sex aut septem distantes in ordinem supra invicem, ad vnam caulis partem digesti, ex sex foliolis commissi, colore purpureo rubentes, aut (quod tamen raro) candicantes: succedunt inde folliculi in rounditate oblongi: semina in his tenuia, paleacea; radix gemini bulbi vno super alterum insidente, quorum superior veris initio minor ac vegetior: inferior major sed flaccidior, qui paulò post perit, in plures subinde multiplicatus.

Post priorem (qui supra describitur) alius sequitur gladiolus Italicus dictus lobellio, binis florum ordinibus, vel vtrimque floriferus qui satis in cæteris cum superiore convenit.

L. Gladiolus vtring. floriferus

L. Gladiolus Narboneti.



R O S A

ALBA, PLENO FLORE. R V B R A, P R Æ N E S T I N A.



Nter omnes flores principatum Rosa facilè obtinet; eiusque in coronis omnibus vsus propè nimius, adè vt Poëtarum versibus decantatissima hodie per tot elegantium adhuc scriptorum vireta immortalem odoris fragrantiam spargere videatur. Plurima hæc varietate fæcunda est. At in satiuarum Rosarum censu hæc prior proceritate caulium sive ramorum reliquas superat; flores ferens candidos perquam odoratos, multorum foliorum. Quæ verò sequitur Prænestina brevior est, virgis bicubitalibus aut altioribus, flore eleganter quidem rubente, sed minus quam Milesiæ, multiplici foliorum ordine conspicuo, odore grato & perquam iucundo.

Rosa alba ple.flo.

.12.

*L. Rosa rubra
prenestina.*



ROSA CENTIFOLIA BATAVICA.

ROSA VERSICOLOR.

Rosa centifolia, a numero foliorum in flore sic dicta, & Batavica a loco in quo copiosè nascitur, etiam veteribus non ignota fuit cum eius celeberrimi scriptores meminerint Theophrastus in hist : Plantarum, Plinius in Nat : hist : Athenæus in libris Diptno quam in Campaniâ Italiæ ac circa Philippos Græciæ reperiri tradunt. Clusius in nonnullis locis iro in flore folia se numerasse refert exinsecus maiora, intrinsecus pusilla florum in medio locum explentia, & in ipsum calycem reflexa; odorem autem deprehendisse ad albæ rosæ odorem accedentem, colorem etiam Prænestinæ non admodum dissimilem licet dilutiorem.

Illi congener esse videtur elegans hæc rosa Prænestinæ similis formâ & magnitudine; quæ ut plurimum dimidiâ ex parte candida habet folia, reliqua rubra, aut tertiâ duntaxat ex parte alba, vel nunc integra alba, modo integra rubra inter se commixta, conspiciuntur.

13
L. Rosa centifolia Batavica.

L. Rosa versicolor.



CAMPANVLA, FLORE CÆRVLEA.

CAMPANVLA, FLORE ALBA.



Vm silvestribus Rapis similitudinem quandam habere videntur, quas Campanulas vulgo nominant quarum tres species a Dodonæo observata sunt. Major vel maxima quæ hic prior exprimitur, folia habet prima lata, & violæ nigræ formâ similia, sed tam majora; quæ verò circa caules quos satis validos promit, oblongiora vtraque saturi viroris. Flores secundum caules gignuntur plurimi, Rapunculi floribus majores ac patientiores, campanulis ferè assimilés, cæruleo nitentes colore: staminibus in medio candidis, Radix novellis plantis digitalis crassitudinis oblonge, vetustis verò inmultas distributa. Posterior species hic expressa minor est, folia habens ubiq; angusta & oblonga, saturato virore splendentia; caules bicubitales, striatos; circa quorum partes superiores, flores prioris satis similes, colore candidi nascuntur.

Belvedere.

L. Campanula flo cœrul.



14..

L. Campanula flore alba.
Ge. Cloxkens.



PAPAVER,
MULTIPLICI FLORE.



Væ hîc species papaveris pleno Flore præditi spectantium obijciuntur oculis. Vtraque constat folijs oblongis, per ambitum serratis, nulloque pediculo cauli adhærentibus: Qui quidem caulis rectus, æqualis, quatuor vel quinque pedes altus, florem profert amplum, latis in ambitu exteriori folijs, & infinitis minoribus coacervatis in medio foliolis repletum candidi vel subalbidi coloris. Semine abundat, quod cum maturuerite, sponte ex fathiscen-
tibus circa scapum capitulis excidit.

Alterum verò papaver florem non minore magnitudine aut elegantia promit, ex infinitis quoque foliolis in extremitate scissis plenum, purpurisso vel carneo quodammodo colore tinctum; cui similiter vt priori semen largè in capitulis nascitur.



L. Papaver flo: multipl:.
G. Pavot.
Ge. Heul.

L. Papaver flo: plen: jncarn:.



LYCHNYS CORON:

FLORE ALBO.

FLORE RVRRO PLENO.

Lychnis coronaria folia gerit oblonga, pollicis latitudine aut paulo latiora, mollia, lanosa, cana, Verbasci foliis minora quidem sed candidiora & lanuginosiora; caules cubitales rotundos geniculatos canos quoque & lanuginosos, in plures breves alas divisos; in quarum summo singuli flores, e calycibus suis sed inodari violæ matronalis floribus majores, ex foliolis vt plurimum quinis, rarissimè senis nec pluribus congesti; nisi floris foliolis multiplicatis; in medio florum apices sunt acuti & pungentes: radices subsunt tenues. Scriitur in Belgeij hortis & per totum ferè æstatem floret.

Lychnis hîc priori loco ponendas florem habet simplicem, colore candidum. Altera verò florem monstrat plenum ex pluribus foliolis colore rubro & veluti flammeo fulgentibus factum.

L. Lychnis coronaria flo: rub: ple:.

I. Lychnide.

G. Oillets.

Ge. Christus oogen.

16.

L. Lychnis flore albo.

Ge. Himmelrößlein.



CARYOPHYLLEVS^{17.} FLOS MINOR,

ALBVS.

COMMVNIS.



Altera & minor Caryophylleorum species, priori tenuibus caulibus folijsque simillima est, vtrisque tamen minoribus; flores habet ex oblongis paruis & teretibus calycibus similes, verum minores & per ambitum magis dissectos ac fimbriatos, plumarum similitudine, vnde apud Belgas nomen invenerunt; colore candidos, aut è candore purpurascens, vel ad carneum tendentes. Hanc plantam Vettonicam altilem sive coronariam minorem, aut alteram, nonnulli nominant; ob amabilem florum elegantiam omnibus expetitam.

*L. Superba alba.**L. Superba flo: simp:.*

18.
CARYOPHYLLEVS FLOS MAIOR.

ALBVS PURPUR. TOTVS SAN- NIVEVS
MAC: VARIVS. GVINEVS. PURVS.



Aryophilleo flori maiori caules leues, teretes, cubitales sūt aut altiores, geniculati: folia è singulis geniculis bina, oblonga, dura, angusta, per extremum acumina, colore quasi cæsia: flores pulcri, ex longis, teretibus, denticulatis calycibus, & é senis vt plurimùm foliolis, qui simplices sūt; ex pluribus verò multiples, (ex quibus hīc expressi, triplici colorum varietate differentes, esse videntur) ijsque lentè fimbriatis, multumque incisis, commissi: odore admodum suavi, & odoratos Indicos caryophillos referentes; in quorum medio staminei emicant gemini apices candidi: semen in vasculis oblongis paruum & nigrum Radices fibrosæ in plures annos durant, modò contra hyemis iniurias tutæ sint.

L. Caryophilus flore albo punctato.

18.

L. Caryophilus flore sanguineo.

L. Caryophilus flore niveo.



MELANTHION

SATIVVM.

FLORE PLENO.



Res Melanthij species plerique faciunt; nos hîc sativum & aliud pleno flore a Clusio descriptum, exhibemus. Melanthium a. sativum vel hortense frutex est pusillus, ramulis tenuibus herbaceis, dodrante altioribus præditus, folijs parvis in tenues & oblongas partes divisis, seneccioni herbæ similibus, multò tamen exilioribus. In cacumine ramunculorum flosculi oriuntur quinque foliorum candidi, plura in medio fila habentes, intercurfantibus internè distinctionibus loculorum quinque vel sex in summitate extrinsecus corniculatis, in quibus semen angulare, nigrum, acre & odorum includitur.

Melanthium verò odorum pleno flore clusio dictum, parum a priori differt; flores tamen ex albo nonnihil virescentes, foliorum numero sæcundiores sunt; ea n. novem decem, plura interdum sibi invicem incumbentia, marginibus quoque aliquantulum scissis, numerantur.

L. Melanthium flore simplici.

19.

L. Melanthium flore simplici.



AUTVMNVS

HORTI FLORIDI

RARIORES AUTVMNI

FLORES SVMMA INDV-

STRIA ET LABORE.

CRISP. PASSÆI FILII.

In are effictos, & in lucem recens datos continens.



VLTVAIECTI.


Ex Officina cælatoria CRISP. PASSÆI

ET

Prostant apud Ioannem Ianfonium Bibliopola m ' Arnhemienfem.

INDEX

HORTI FLORIDI, AUTVMNALIS.



<i>Lematis altera, Purpureo Flore.</i>	Fol. 1.	<i>Cyclaminos Belgica, folio hederæ.</i>	Fol. 14.
<i>Rosa Moschate, pleniore flore</i>	Fol. 2.	<i>Narcissus Indicus, flore purpureo.</i>	Fol. 25.
<i>Flos Solis maior, vel Chrysanthemum Peruvianum.</i>	Fol. 3.	<i>Narcissus Autumnalis, flore tam plenis quam raribus folijs Luteo.</i>	Fol. 15.
<i>Canna Indica</i>	Fol. 4.	<i>Hyacinthus Autumnalis, maiore ac minore floru.</i>	Fol. 16.
<i>Flos Tunitensis maior, flore rarioribus folijs prædito.</i>	Fol. 5.	<i>Hyacinthus obsoletior, Hispanicus.</i>	Fol. 21.
<i>Flos Tunitensis maior, pleno flore.</i>	Fol. 6.	<i>Parthenium tam polyphyllò quam simplici flore.</i>	Fol. 17.
<i>Flos Tunitensis minor, tam pleno quam rariore flore.</i>	Fol. 7.	<i>Colchicum vulgare, purpureo & albo flore.</i>	Fol. 18.
<i>Malua rosea, pleno flore.</i>	Fol. 8.	<i>Colchica, Byzantinum, & simile Fritillariæ.</i>	Fol. 19.
<i>Malua Crispa.</i>	Fol. 9.	<i>Colchica, versicolore, Montanum & Lusitanicum.</i>	Fol. 20.
<i>Ricinus minor.</i>	Fol. 10.	<i>Colchica, Neapolitanum & polyphyllanthos.</i>	Fol. 22.
<i>Admirabilis Peruviana</i>	Fol. 11.	<i>Crocus, vulgaris, & Montanus Dod:</i>	Fol. 23.
<i>Tabacum Latifolium.</i>	Fol. 12.	<i>Crocus Byzantinus, argenteo flore; & Crocus flore purpureo.</i>	Fol. 24.
<i>Cyclaminos Romana rotundifolia.</i>	Fol. 13.	<i>Utriusque Cyclamini radix.</i>	
		<i>Bulbus Narcissi Marini.</i>	

IN FLORILEGIUM
CRISP. PASSÆI.



*Ignora cælestis regni, lectissima
Mentis
Pabula, se quorum Numen
honore probat;
Divini FLORES: quos fru-
strà expresserit Auro,
Aut Ostro Isacide gloria summa domus.
Vosne ego desueto dilaudem Carmine, passim
Audax Nature se reserantis opus?
Debentur tantis equidem alta silentia rebus:
PASSÆI hic potior muta pœsis erit.
Illius est formis incisos prodere Bulbos,
Et Calices, Thyrsos, Stamina cum folijs,
Omnigenumq; decus; toto quod paturit anno
Aemula Pæstani terra. BATAVA soli.
Quis sit Veris honor, pictis que gratia septis
Purior æstivo dum calet igne polus:*

*Quis color Autumno, quis sit quoque satus in
hortis
Brumali (mirum) cum riget aura gelu
Hæc, inquam, excudet spiranti mollius ære
CRISPVS; nature conveniente manu.
Desit odor liceat, desunt quoque dâna crumena:
Exiguo FLORAM hanc quilibet ære paret.*

GERAR. SANDELIN V. N.
ET IC.^{III}

DE AUTUMNO.

*I*Am nunc ardentes AUTUMNVS fregerat Umbras,
Atque hyemem tepidis spectabat Phæbus habenis.
Iam platanus iactare comas, jam ceperat Uvas
Adnumerare suas defecto palmite vitis.
Ante oculos stabat quicquid promiserat annus:
Nec grati deerant ornato vertice FLORES


BENIGNO FLORVM AC OMNI-
VM NATVRÆ IPSIVS ELEGANTIARVM
AMATORI AC ADMIRATORI. S. D.

C R. P A S S E V S. F I L.



Ignitatem ac elegantiam Florum non aliò maiore encomio illustrare ac celebrè reddere possum, quàm
ipsius summi patris filij, qui divinæ suæ vocis oraculo omnem Imperij mundani, atque adeo Solomo-
nis, quotquot vnquam fuerunt regum sapientissimi ac ditissimi, maiestatem ijs inferiorem pronunti-
avit; neque id sine justissimâ causâ cum facile omnem humani ingenij industriam infinitâ suâ, sive co-
lorum pulcritudine, sive formarum varietate, sive odorum suavitate, sive foliorum elegantia, superent:
ita vt inter omnia naturæ omniparentis miracula nullum illustrius aut magis mirandū prodeat specta-
culū, quàm illud, quod terra in procreandis floribus continuò edit. In quo sanè illustre exemplū hominibus suæ fragili-
tatis proponitur, hodie n. flos summa pulcritudine nitet, ac cum oculis spectantiū quoque animos ad se allicit, qui sequē-
ti inde die cū omni suo decore exaruisse comperitur. Quare patientissimus mortaliū lobus apta admodum similitudine
vitam humanam cum flore composuisse legitur. Vnde etiam tam olim quā hoc nostro potissimū avo, plures eximij ac
excellētis ingenij viri inventi sunt, qui omni studio ad interiorē hanc considerationem animū applicuerūt, nullis sump-
tibus aut laboribus parcentes, quin continua indagazione naturæ hæc arcana recluderent, & quotidie novos & invisos
antea flores ac herbas in lucis Theatrum producerent: Inter quos principes *Dodonæus ac Clusius* nuper admodum vixerūt,
doctissimis & curiosissimis libris ad posteritatē transmissis, plures suæ sectæ discipulos relinquētes, qui nō minus ac olim
Romani *FLORÆ DEÆ*, honestiore tamen fama, litare videntur. Verùm cum sit à debilitate ingenij mei alienum flo-
rum hic encomia sten agere, ad instituti huius tantummodo rationem reddendam, properabo. Cum n. proposuissem ar-

tis meæ Tyrociniū (quo hætenus sub patris signis delitui) deponere, eiusque nihilominus laudabilibus insistere vestigijs in animo haberem, nihil mihi prius faciendum putavi, quàm vt memor *Horatiani* præcepti, miscerem vtilia dulcibus, quod maximè præsentī hoc opere palam me facturum spero, propterea nulli me quantumvis ingentes labores deterruerunt, in vestigandis depingendisque imaginibus rariorum ac minimè vulgariū florū, quos ad ipsam veritatem & vivā formam quam proximè expressi, simul cum suis folijs & radicibus; quibus addidi descriptionem satis planam & plenam, & varijs in linguis nomina; & ne quid desit rationem adiunxi, quàm aptissimè colores singulorum florum exprimendi. Neque me ab incepto revocavit, quòd & ab alijs hoc tempore & antè, similia tentata sint, cùm plura in ijs à multis videam desiderari, quæ à me vel correctæ, vel suppleta, vel addita de novo invenies, cuius rei benignitatis vestræ iudicium erit. Neque n. vnquam terra facunda mater otiosa est, precipuè ab industriâ humanâ provocata, quin quotidie novis pangendis floribus fatiscat, & humana curiositas ex omni solo non visos antea fructus & flores adducat. Distingui a secundū quatuor anni tempora flores, & in ordinem quodammodo redegi, vt quo tempore potissimum quique nascantur, apertum sit. Nam licet Ver innumeris coronetur floribus, & huic ætas odoriferâ caliditate succedat, non tamen Autumnus omnino hoc honore privandus est, qui cum fructibus, quibus annum ipsum auget, elegantissimos quoque flores producere solet; quin & Hyems, quæ claudere terræ sinum horrendo frigore dicitur, accedente hominū industriâ florum quoque varietate inter nives & grandines mitescit, idque nuper ex alieno orbe adductis plantis, quæ vel invito cælo florescant: adeo vt iam *Batavia* nostra vel cum quovis cælo ac solo certare eâ in re didicerit, vndique patente per apertum Oceanū viâ, quâ quicquid in orbe rarū advehitur. Et licet hic obiectū florum amatoribus non diffitear, peregrinos flores oculos quidem suâ raritate pascere, sed boni odoris expertes esse; idque sæpius ob mutationem terræ & aëris, calorifque defectu fieri contingat, ingenio tamē succurri posse, nec omnes flores exoticos in odores esse, verum est. Sunt n. Tulipæ, sunt Lilia Byfantina alijque quàm plures suavi & amabili odore fragrantés, & Rosæ pleno multiplici folio candidæ ab odore incundo Muscæ vulgo dictæ creduntur.




Meridies

Oriens

Occidens

Septentrio

CLEMATIDIS ALTERA SPECIES
DOD: FLORE PURPUREO.




Lematis altera à Dodoneo descripta, Græcis quoque *Επιήτις* & latinis Anibuxum dicta, circa Autumnum ferè florescens, sarmentis in altum assurgit, longioribus, tenuibus, nodosis ac rubescentibus, quibus firmiter instar hederæ, arboribus, alijsque rebus vicinis adheret. Multa illi folia scissa ac divisa, lata, venosa, & Flammulæ prioris non dissimilia; gustu acri ac fervido. Flores sunt magni, & admodum elegantes, ab extremis ramulis tenuibus singuli propendentes; quatuor tantum folijs crucis in formam decussatis, constantes; purpurei coloris, modò ad cæruleum, modò ad rubidum magis accedentis; cuius medullium occupant quædam stamina villosa. Semen est planum, & in capitula rotunda congestum, longâ villosâ reflexâque caudâ exornatum; quod in Autumno maturescit. Radix oblonga, tenuis, obliquas hinc inde spargens fibras flavescentes. In Italiâ & Hispaniâ sponte passim juxta sepes & vias provenit; apud Belgas verò nostros, non nisi in hortis curiosorum invenitur.



L. Clematis alba Purpureo flore
ga Viorn.
H. Gornadern
Ge. Brackeryt, ofte
Waldrebe

ROSA MOSCHETTA, PLENO FLORE.



Rosa Moschata multiplex pleno flore simplici rarior est; colore candidissimo ac purissimo, odore admodum fragranti (quo tamen à simplici superatur) suavissima, & moschum proximè referens: vnde & ei nomen ab Hetruscis inditum. Damascenū hanc nonnulli appellant. Quidam etiam Plinij Corneolam sive Coroneolam, arbitrantur; quam mediā magnitudine autumnalem, odoriferam, & coronis faciendis aptam, tradit. Spinas habet rariores, acutas admodum & reflexas spadicij coloris. In cæteris ferè cum alijs rosarum stirpibus convenire videtur, nisi quod in Augusto tandem ac Septembri florem emittat. Superant quoque humidę aërię & spirituosę partes, in Damascenis hisce sive Moschettis, quas cum candidis & dilutè rubentibus prestantiores, Mathiolus scribit: atque ex his eā de causā elicitur gratissimi ac suavissimi odoris liquor, ad varios in medicinis vsus aptissimus; qui ferè ex alijs rosis inodorus est.



L. Rosa Moschata alba
pleno flore.
I. Rosa Moschata majore
G. Rose musquée double.
Gr. Dubbelde mosfaat Rose.

3
CHRYSANTH: PERUVIANVM MAIUS
ET MINVS.



Chrysanthemum Peruvianum maius, annua quidem sed admodum proce-
ra (vnde & Italis planta maxima dicta est) stirps. In Peru alijsque Americæ
Provintijs repertum fertur. Satū Madritij apud Hispanos, in Horto Regio,
ad pedes 24 adolevit; at in Italia Patavij altitudinem 40 pedum attigisse
scribitur. In nostris a Provintijs rarò admodum vnius hominis longissimi
altitudinem superavit; aut ad justam maturitatem florem produxit, etiamsi
per Antuninū ad hyemem vsque perduret, idque ob insuetam frigoris intemperiem. Cau-
lem promit rectū brachij crassitudine: folia latissima crenatis marginibus: florem Chry-
santhemo vulgari aliquatenus forma similem, sed amplissimum, & mirâ elegantiâ prædi-
tum: Medius siquidem eius discus sive orbis pedem latitudine ad 2. vel 3. uncias excedit,
singula verò ipsum orbiculariter ambientia folia, floris Lilij purpurei maioris quodam-
modo sunt similia, sed maiora, auri luteo colore; quibus tandem deficientibus, relinquit in
medio orbe luteo semen oblongum & planum. Radice oritur aliquantulum tuberosâ &
capillatâ. Flos etiam ad Solem se convertere dicitur, & odorem non ingratum à se emitte-
re. Minus Chrysanthemum Per: vix ad septem vel octo pedū altitudinem pervenit, habet-
que vtrimque exorientes ramusculos, qui & suis interdum floribus ornantur.

L. *Chrysanthemum Peruvianum maius*.
I. Tromba d'Amore.
P. Gigante.
Ge. Grootte sonne blôme.
Sonnenkron.
An. Indien Goldē
sonne.

3.

L. *Chrysanthemū Peruvī minus*
Ge. Kleyne Sonnenbloeme.



4
ARVNDOSIVECANNAINDICAFLORIDA.



Anna Indica, quæ & Arundo Indica, & à quibusdam Cannacorus, quod mediâ inter acorum ac arundinem sit formâ, dicitur; in Belgium ex Indiâ occidentali primùm allata est. Flores producit gratissimi adspectus ex aureo, flammeo que colore, nigris punctis interstincto; idque serius circa finem Augusti, inque Septembri mense: quorum forma ac magnitudo non multum à gladiolo distat: oriuntur a. ex scapo arundineo tres vel quatuor pedes alto, lævi admodû & subviridi, digiti vnus crassitudinis: vnde & ad internodia singula in ambitu folia ampla & convoluta ad instar Acori vel veratri albi perfecti enascuntur. Radix ad similitudinem nostræ vulgaris arundinis vel saltem Hispanicæ, aut etiam Acori aquatici accedit. Seminis loco habet ossicula rotunda erui magnitudine, sub villosis involucris latentia, à Doctissimo Clusio plenius descripta. Rarò autem sub frigidiore hoc cælo ad justam maturitatem pervenire multorum opinio est.



L. *Arundo Indica florida*.
I. *Canna d'India*.
G. *Roseau d'Inde*.
Ge. *Indiaensck bloeyende*
riet, ofte
Blumenrohr.

FLOS APHRICANVS MAIOR RARO
FOLIO.




Flos Aphricanus sive Tunitensis maior simplex, folijs est rarioribus & latis, colores inter aureum & rubicundum medij, superiori tamen in parte magis & obscurius rubétis; inter quæ media exeunt stamina lutea, densè inter se aptâ rotunditate connexa. In Autumno potissimû viget; aspectu quàm odore incundior; Vnde & medicorum inditio cautè asservandus, ne suo veneno plus damni, quàm voluptatis, præsertim pueris aut tenellæ ætati afferat. Cæterùm huius plantæ ramusculi, folia, radix, quantum ad formam attinet, non multùm à minoris Africani, hîc in sequentibus plenius descripti, differunt, nisi quod hic flos, ex procero atque erecto caule ad tres vel amplius cubitus assurgens, maioris de coris amplitudine spectantium oculos detineat.

I. *Elaeagnus mator*.
I. Garoffano Indiano.
G. Grand Oeillet d'Inde.
G. Groote Thunis blom, ofte
Groß Indiansch Neglein.



6

FLOS AFRICANVS MAIOR MVLTIFOLIUS.



Los Africanus maior, plenus sive multifolius, miro colorum splendore superbit, ex folijs n. quàm plurimis, apto admodum ordine in orbem rose instar collocatis, inferius luteis, superiori verò parte in fulvo rubentibus, & obscurè rubens holosericum simulantibus, congestus est. In Autumno tandem prodit, & ad hyemem vsque perdurat. Planta procera est & erecta, ad quinque vel sex pedes in altum assurgens; cuius ramusculi, folia, radix & sem en proxime ad minoris Africani accedunt. Quidam hunc florem Petilium Plinij, alij Lycopersiũ Galeni; Andreas verò Lacuna Othonam Dioscoridis, crediderunt. Sed quavis aliquã similitudine jungantur, non tamen in omnibus convenire, diligentius horum scriptorum verba examinanti, facilè constabit.

- I. Flos Africainus maior multifolis.
- I. Girafano Indiano maggiore.
- G. Grand Oeillet d'Inde double.
- Gr. Grote dubbelde Thunis blom.



7
FLOS TVNETENSIS MINOR.



Lozem Africanum minorem (cuius hic duo sculptæ sunt species, pulcritudine & numero foliorum tantùm inter se distantes) Val: Cordus Tanacætum Peruvianum appellat, à similitudine videlicet Tanaceti, & quod hunc ex Peruvianâ Proviñtiâ in Europam illatum, Germani crederent: Gesnerus verò Calthã Africanam nominat, eò quod ex Africâ, quando Carolus v. Imp: Tunicensi ibidem victoriâ potitus est, in Belgium primùm allatus sit. Planta est humilior, ramulis cubitalibus, per terram plurimâ parte stratis. Folia sunt secundum caules striatos multa, oblonga, ex multis singularibus, per ambitû crenatis, conjuncta; quæ cribri modo soli opposita perforata cernuntur. Flores in summis ramorum surculis, ex longis calycibus, pro quantitate ampli & rotundi, foliolis inferius luteis, superiori verò parte magis rubentibus, & villosum holosericum obscure rubens emulantibus, quorum odor inamabilis, imò noxius. Loco radicis fibræ sunt, quæ hyeme pereunt: Semen est nigrum, formâ oblongum & tenue.



L. *FlosTunetensis minor.*
I. *Girofani de India.*
G. *Ocillets d' Inde.*
Ge. *Kleyne fluweel bloemen, ofte*
Indianisch Negelein.

3

MALVA ROSEA MULTIPLEX.



Ve hic malvarum hortensium species exprimuntur: Vna n. florem fert rarioribus folijs, coloris carnei, circa extremitates marginum magis albicantis, puniceis per medium lineis sive virgulis intercurrētibus, non ineleganti varietate constantem. Alterius verò flos plenior est, rubicundi coloris, aliquam cum Pœonijs phœnicijs aut rubicundis maioribus similitudinem habens. Vtrique scapus rectus est, qui in altum sex vel septem pedes attollitur; à quo folia satis magna, scissa, in ambitu ferrata, & in acutum desinentia, dependent. Cum autem è floribus vel rosis folia decidunt, semen latum, suis in folliculis caseolorū formâ (vnde & Belgis Keefkens cruyt dicitur hæc planta) coactum, conspicitur, quod cum maturuit, caulis vel scapus interit, qui secundo tandem anno è semine prodierat, & florem in Autumno demū miserat, Radicē habet longam, crassiusculam, subalbidam, & flexilem; altè in terram descendentem, venienti iterum anno novum scapum, ramulos, ac folia producturam.

L. *Malva rosea multiplex*.
I. *Malva maggiore*.
G. *Rose d'outre mer double*.
Co. *Dubbel Winterrosen*.



MALVA⁹ CRISPA.

MAlva crispa, à folijs crispatis sic appellata, Cordo verò Lancinata dicta, & ab alijs Maliva crustati oris; licet inter silvestres referatur Malvas, rarò tamen alijs in locis quàm cultis ac hortensibus crescere visa est. In altum asurgit caule recto: folia habet rotunda, sinuosa, lubrica, viroris diluti, quorum margines crenati vel potiùs crispatis. Flores producit in Autumno exiguos, albos, & aliquantulum rubicantes. Radices huic sunt plures, haud magnæ, & minoris crassitudinis quàm sativæ. At quã utilis sit Malva, & necessaria in communi hominum vitâ, non tantùm medicorum scola, sed & nos antiquissimorum poëtarum oracula abundè docent; & imprimis illustre illud, Hesiodi:

Οὐδ' ἴσασι ὄσον ἐν μαλάχῃ τε κὶ σαφασίλῳ μέγ' ὄνηαρ.



I. *Malva crissa*.
I. *Malva crepa*.
G. *Malva crepa*.
Ge. *Georronchele Maluc.*
Krauß Pappelen.


10

RICINVS MINOR.




Ricinus, Græcis κρότων, & Ægyptijs (apud quos etiam hodie copiosè nascitur) kiki dictus, nomen accepit à Ricini animalis similitudine. Procerè magnitudinis est planta, quæ brevi tempore in ficus parvè altitudinè sese attollit, stipitem habens in medio hominis longitudine, crassiusculum, arundinis in morem cavum, & nodosum; vnde ad singula articulorum interstitia ramuli erumpunt, ex nigro purpurascens; è quorum summitate folia propendent instar stellæ in orbem grandia, oblonga, crenata, in acutum desinentia, coloris prasini obscurioris, nonnullam cum folijs ficulnæ similitudinem habentia, nisi quod longiora multo ac læviora: cum quibus & alij surculi dodrantaes prodeunt, baccis vix instar plurimis constipati; quarum flosculi subviridis ac mellini coloris admodum sunt caduci. Fructus a. exterius colorem habet Livi dum maculis intercurrentibus notatum; intus candidâ medullâ repletur. At semen triplici involucro & spinis mollioribus munitum, cum corticibus exiit ricinum, vt dixi, insectum proximè repræsentat. Radix est multiplex, & ex varijs fibris conjunctis constat.

L. Ricinus.
I. Girasole.
G. Palme de Christ.
Ge. Mollencruye ofte.
Wanderbaum.



II

ADMIRABILIS PERUVANA

 Æc planta, Hachal Indi à Peruanis natali in solo dicta, & nostris Admirabilis Peruvana, caulē promit cubitalem, interdum etiam maiorem, pollicari crassitudine, succulentum, firmū, ex viridi flavescentem, & in frequentes ramos eosque nodosos divisum; folia in singulorum ramorum geniculis bina, ex adverso semper nascentia, siliqua stri folijs simillima, succulenta etiam, circa basim ampla, & per extremum mucronata: flores in extremorum ramulorum alis singuli, oblongi, concavi, in quinque sinus antequam aperiuntur complicati; in obtusos angulos ut convoluoli flores desinentes, Tabaci etiam floribus ampliores; elegantissimā interdum purpurā vel Cocco nitentes, aliquando flavescentes vel exalbidi; & sæpissimè binis coloribus simul elucescentibus, vel purpura mediam floris partem occupante, vel virgatim totum florem intercurfante, vel radijs alternis modò flavis modò purpureis totum distinguentibus; aut interdum magnis, nonnunquam exiguis purpurantibus maculis; oblongis quoque staminibus stiloque paulo longiore è medio flore emergentibus decori; sed admodum caduci cum sint, nec ultra diem perdurēt; nihilominus ab Julio ad Octobrem vsque mensem numerosā florum sobole hæc planta luxuriare solet.

L. *Flos Mexicanus*.
I. *Gelsemino Indico*.
Ge. *Iasmyn van Indien* ofte.
Ge. *Gescheket Indianisch blum.*

G. *Merveille d'Inde* ¹¹
a diverses couleurs.



PETVM MAIVS, SIVE LATIFOLIUM

PEtum hoc nostrum Peruvianum latifolium, ad discrimen minoris, quod est angustioribus folijs, dictum; à quibusdam mas vocatur, ideo quod sit dignius & maiori in pretio habeatur. Annua hæc ut plurimum at nihilominus procera est planta, utpote quæ ad quinque vel sex interdum pedes attollitur; caulem habens satis firmum, molli incanâque lanugine hirsutum, per quem alternatim hinc inde sparsa folia Hyoscyami flavi folijs maiora, Lapathi vero non multum ab similia, sed latiora, molliora, dilute virentia, tenuique lanugine quasi pubescentia, atque adeo arcte ramis adhaerentia, ut eos complecti velle videantur. Summus caulis in aliquot ramulos inflexos dividitur, qui calyculos ferunt in quinque cuspides satis firmas desinentes, in quibus flores cavi è purpurâ pallentes, sed circa extremas margines ferè albentes; atque in quinque mucronatos angulos desinentes circa Autumnum nascuntur: Floribus succedunt bullata capitula semen subflavum continentia. Radix satis crassa, & in plures minores propagines divisa.



L. *Hyoscyamus Peruvianus*.
I. *Negotiano*.
G. *Nicotiane*.
Ge. *Taback ofte*.
Bilsen cruyt van Peru.

r 3

CYCLAMINOS ITALICA ROTVNDI- FOLIA.




Cyclaminus Italica, quæ etiam à non nemine Romana dicta est, quod in locis Romæ vicinis frequentior invenitur, ex radice rapi in modum rotunda tenuibus nigricantibusque fibris præditâ, multa circumscripta propemodum rotunditatis, vel potius cordis figurâ profert folia, leviter in ambitu crenata palmari ferè magnitudine, superne jucunda varietate, nunc levioris nunc obscurioris coloris, (quorum tamen medietas ad nigredinem accedit) virentia, infernè æqualiter purpurascens, humi jacètia & expansa, flores in oblongis pediculis vnico folio, sed in quinque profundas lacinias diviso, sic vt plura videantur, constantes, quæ sursum cum sese explicare incipiunt, reflectuntur, plenè purpurascens, odoris suavissimi; qui cum evanescere incipiunt, integri decidunt, capitulumque subsequitur se cum pediculo cui infidet in multas spiras convoluens, donec terram attigerit, atque ibi paulatim augetur, & violæ Martiæ seminariū vasculum æquat, quod maturitate ab extremo mucrone aperitur, semenque ostendit inæquale ex fusco purpurascens.

L. *Cyclaminos Italica rotundifolia*.
I. *Pain porcino*.
G. *Pain de porceau*.
Ge. *Verckensbroot*.
Erdapfel.



CYCLAMINVS¹⁴ FOLIO HEDERÆ.



Cyclaminus à circulari seu rotundâ radicis formâ nomē accepit; dicitur etiam terrę tuber, & terrę rapum, Gallis panis porcinus, non tamen satis aptè, cùm radix Cyclamini porcis sit noxia. Nascitur verò locis vmbrosis, sub arboribus maximè; folijs hederaceis in ambitu nonnihil crenatis, pulcrâ macularum picturâ, alternante colore, nunc dilutiore, modò obscuriore, virentibus, ac circa terram repentibus: caule longo digitorum quatuor, nudo, folijsque carente, in quo flores ex remissione purpura albescentes exigui odoris. Radix exterius nigra, intus candida, rapo similis, in latitudinem se pandens; quæ cum arefcit, rugas contrahere solet. Folia nonnunquam sub Augusti finem amittit, ac nova subinde producit, inter quę flores se proferunt integro durantos Autumnno.

L. *Cyclamen folio hederæ.* 14
I. *Pan porcino.*
G. *Pain de Porceau.*
Ge. *Verckens broot met veylbladeren*
Erdſcheib.



15

NARCISCVS AVTVM: MAIOR LV-
TEO FLORE.

NArciscus Autumnalis maior Clusij ē radice prodit rotundā & bulbosā fo-
ris nigricante cortice seu membranā obductā, intus albidā, fibras carnosas
ex inferiori sede diffundente: folia a. edit Leucoij bulbosi vulgarioris ferè
effigie reflexa, nitidā saturitate virentia, ac neruo per mediam longitudi-
nem distincta: Caulis inter illa locatur brevis, extollens circa Septembrem
mensē florem Colchici æmulum (ad cuius etiam familiam pertinere vi-
detur) flavi coloris, quinque vel sex carnosis folijs, totidem stamina tenuia, apicibus obli-
quatis luteis fastigiata, ac stilo prominentiori circumiecta, fulcientem: Semina nondum
obvia fuerūt. Hunc ego verū Theophrasti Lirion vel Narcissum Marcelli Virgilij esse pu-
to. Narcissus verò Autum: flore multiplici parum à Narcisco Autum: priore discrepat, nisi
largiore foliorum numero, quò gratiam sibi maiorem conciliat.

L. *Narcissus Autumn: maior flore luteo.*
I. *Narcisso de Autunno mag:*
G. *Narcisse d'Autumne.*
Ge. *Große herbst-Narcissen.*

15

Ge. *Dubbelde groote herfst-Narcissen.*



16

HYACINTHVS AVTVMNALIS.



Yacinthus Autumnalis sive serotinus folijs est oblongis cavis, angustis, parvulis, coloris porracei, cauliculis brevibus, tres aut quatuor digitos altis, flosculis in summo raris, cæruleis; staminibus in medio exiguis: semine in siliquis triangularibus exiguo, nigri coloris: radice parvâ & bulbosâ. Nascitur frequens in Gallijs circa Lutetiam. Et incipit florere in exitu æstatis, Augusto & Septembri mensibus; unde & merito Autumnalis nominatur, neque aliud eius nomé adhuc audivimus. Duo eius sunt genera: vnum, crassioribus longioribusque folijs numerosiore flore, ac bulbo maiore; unde & Hyacinthus Autumn: maior dicitur: alterû minora omnia habet & rariora; unde & Hyacinthus minor audit, cuius caulibus floribus plenè purpureis tanquam racemus onustus, priusquam folia nascantur, è terrâ non ineleganti prodit spectaculo.

L. *Hyacinthus Autumn. minor.*
G. *Vaciet d' Automne .*
Ge. *Klein herbst Hyacint.*
Cley. *Hyacint vā dē herfst*

L. *Hyacinthus Autumnalis,*
sive serotinus maior .
I. *Cipolle camino*
d'Autunno .



P A R T H E N I V M .

PArthenium officinis Matricaria (cuius hic duo exhibentur genera præcipuâ in floribus differentiâ) seriùs provenit, & veniente Autumnno potissimum floret; multis a. fruticat ramulis pedali bus viridi bus, quos ambiunt folia Anthemidi omnino similia, multiplici incisione divisa. Flores esummitate ramulorù prospiciunt, habentes in medio capitula mellini coloris, in circuitu pluribus foliolis candidis ornata, haud dissimiles Chamemeli floribus. Radices sunt duriores, & in fibras tenuiores desinentes. Estque tota hæc planta gravis odoris, & saporis amari. Parthenium vero pleno flore præditum à Clusio descriptum, parum discrepat à vulgari, nisi quod flores multiplici foliorum numero constât, nullo aut perquam exiguo in medio aureo disco, minus quoque habeant odoris. Lætius crescit ex plantâ aut radice quàm semine. In Britannîâ abundat, quod ab arte & industriâ fieri videtur; quandoquidem plura inde florum genera multiplici foliorum serie constantium primum in vicinas Provincias tracta sunt.


L. Solis oculus.
I. Marella.
G. Maroine.

17

L. Parthenium pl.
Ge. Matercruec ofte
(Mutterkraut.)



COLCHICVM VVLGARE.



Colchicum vulgare hic depingitur duſum generum , remiſſè purpuraſcēs v-
 num, album alterum ; ſed præter colorum & radicis diſcrimen , exigua eſt
 differētia: Sic ferè à Dioſcoride diſcribitur : Colchicon, aliqui Ephemerō,
 ſunt qui agreſtum bulbum vocant, Autumni exitu florem edit Croci, cādi-
 cantem: ab eo tempora folia Bulbi, ſed pinguiora. Caulem palmo altum,
 ferentem rufum ſemen: radicem foris è nigro rufefcentem quæ delibrata,
 candida & mollis ſpectatur, lacteo ſucco madet, atque guſtu dulcis invenitur. Ea comeſa
 Fungorum more, ſtrangulando necat. Bulbus eius mediam habet rimam, quâ flos erumpit.
 Dodonæus a. folia atque ſemen præcedere, ijsque deficientibus in Autumno demum flo-
 res plures ex teneris pediculis nullo foliorum ornatu nudos prodire, ſcribit. Radicem quo-
 que albi colchici omnino candidam eſſe & innoxiam à Valerio Cordo deſcriptam tradit.

L. Hermodactylus.
Ge. Weiß Zeitlosen.

L. Colchicum purpureum.
I. Colchico .
G. Tuechien .
Ge. Zeitlosen .



COLCHICVM BYZANTINVM, ET RETICVLATVM LVSITANICVM.



Colchicum Byzantinum latifolium multiflorum, cuius acutissimus naturæ mystes C. Clusius meminit, In Autumno, ex nudo caule, in pediculis crassiusculis flores producit plures, vulgaribus maiores, ac Lilijs pumilis æquales; colore exterius magis diluto, intus verò saturatiore purpureo, venis quibusdam in longitudinem intercurrentibus; radix pugno maior, vnde vere incipiente oriuntur tria quatuorve magna folia, in se instar veratri foliorum convoluta, sed magis saturati viroris. Colchicum adiunctum Lusitanicum florem habet Byzantini non adeò dissimilem, nisi quod sit minor, & Fritillariæ in morem reticulatus, vel maculis veluti obscure rubentibus variegatus, iucundâ oculos spectantium puncturâ mirè ad se attrahens, odore licet perquam exiguo vel nullo.

L. *Colchicum Byzantinū multiflorum.*
Ge. *Colchicum van Constant met*
brede bladeren.

19

L. *Colchicum Ilystanic reticulatum.*
Ge. *Portugaelsche Colchicum fritillare gelyck.*



20

COLCHICVM. FLO- COLCH. COLCH.
RE VERSICOLORE. MONTANVM. LVSITAN.



Colchicum flore versicolore, radicem habet magnam, & serius post alios, tres quatuorue ex brevi scapo secundū terram producit flores, foliolis rotundioribus obscurioribusque; horum tria interiora ex purpurâ rubescunt, & reliqua exteriori parte lactis candorem retinent, interiore verò radijs punctisque violacei aut coccinei coloris intercurrētibus variantur. Ab hoc differt Colchicum Hispanicum Montanum, quod in Septembri promit florem, sex longiusculis & tenuibus folijs ex purpurâ rubentibus; quem subsequuntur tria, vel quatuor folia digitali longitudine carinata, circa terram se spargentia, plenâ primum viriditate nitida, inde ruffum colorem imitantia, quæ per hyemem durât ad Maium vsque sequentis anni; tunc n. semen globosum fulvum que maturefcit. Radicem autem habet bulbosam, spadicei coloris tunicis vestitam; intus albam, solidâ, dulcem. Nec per omnia huic convenit Colchicū Lusitanicum ferotinum; cuius flos exalbidus; perlucidus, ad supremas margines coccino notatus, cætera Byzantino propior.

L. Colchicum hispanicum montanum .
Ge. Spaensh Berch Colchicum .


20

L. Colchicum flore versicolore .
Ge. Colchicum met verscheide vervijge bloemē .

L. Colchicum hispan: serotinum .
Ge. Spade portugalsche Colchicum .



HYACINTHVS HISPAN: OBSOLETIOR:
HYACINTHVS BRUMALIS.



Yacinthus Hisp: obsoletior constat quinis aut senis folijs oblongis, carinatis, succi plenis, colore ex cinereo virescente, flexibilibus, per extremum rotundis & mucronatis, candida linea interius per longitudinem excurrente: caulis è medijs folijs prodit pedali lōgitudine, denos, duodenos, aut plures flores per intervalla ferens deorsum spectantes, Hyacintho Belgico, sive non scripto Dodonæi propemodum similes: color in ijs admodum obsoletus, ex purpureo, pallido & virescente permixtus, nullus odor: semen fert in capitulis planū, nigrum, cartilagineum, circinata ferè rotunditatis: radix globosa & rotunda, multis candidis tunicis involuta, & numerosis fibris sessili in parte prædita est. Serò germinat, & folia per Autumnum servat.

Hyacinthus Brumalis orientalis, cū orientali exalbido in plerisque convenit; sed cum hyeme è terrâ prodit, & caulē per medias nives extollit; Folia habet succulenta, & ferè semper erecta; flores fert circa finem Decembris cādido colore amabiles, sed in ipso ortu paululum circa margines purpurascētes. Radix subest bulbosa, intus candida; subruffo exterius obducta colore.

L. Hyacinthus Hisp : obsoletior.

21

*Ge. Wynterschen witten orientael
Hyacinth.*

L. Hyacinthus brumalis . lobely



COLCHICVM NEAPOLITANVM, ET POLYPHYLANTHES.




Colchicum à Colchide regione in quâ copiosissimè provenit, dictum est. Huius multa, sive ab arte, sive à loci aut celi mutatione, varietas; quod & ex superioribus folijs, vt hoc præsentì apertū est. Colchici n. Neapolitani flores licet violacei vel dilutioris vel plenioris sint coloris, quemadmodum vulgaris, folia tamen habent longiora, & si ad solem spectentur perlucida, reticulataque instar Fritillarię, flammei coloris. Colchicum verò Polyphy-lanthes pleno admodum flore lætius, è Germania allatum, & in amœno com: Arenbergij viridario à Doctis: Clusio descriptum florem fert non multum colore à vulgari differen-tem, sed viginti pluribus folijs arctè inter se connexis, quorum sex postrema ceteris longi-ora atque tenuiora sunt, luxuriantem. At bulbus cum ætate foliorum in floribus numerum augere, perhibetur.

L. Colchicum Neapolitanum
Ge. Colchicum van Napels.

22

L. Colchicum polyphyllantes
Ge. Dubbel-bloemige Colchicum



23

CROCUS SATIVVS: ET MONTA-
NVS PRIMVS.




Roco fativo folia sunt oblōga, perquàm angusta: flores pulchri, colore cæruleo, Colchici floribus similes, sed magis saturatâ purpurâ nitentes; & in singulis stamina oblonga terna quaternave colore flammeo subrubentia, odore cùm inaruerint forti, & caput implente; quæ cæteris partibus præferuntur, colliguntur, & Croci nomine vel sola veniūt: radix subest bulbosa, carnosa, copiosa, & vivax. Autumno Crocus florere incipit, statim vt Theophrastus ait, primis imbribus Vergiliarū occasu. Florem edit ante folia, quæ mox sequuntur, & hyeme totâ virent, æstate nullibi conspicua. Seritur depositis radicibus bulbis.

Alter crocus hic expressus est ex silvestribus montanis, habetque folia fativi similia, sed lineis candicantibus per longum currētibus distincta; florem quoque minorem & dilutioris coloris, in Novembri mense maximè conspicuum.

L. Crocus -
I. Zaffrano.
G. Safran -
Ge. Saffraen.

L. Crocus Montan.
Ge. Berch herbst
Saffraen.



24
CROCUS BYZANTINVS
CROCUS MONTANVS HISPAN.



Rocus Byzantinus Autumnalis, (Crocum montanum tertium vocant alij) ex genere silvestrium, flores profert plures in Octobri mense, nullius ferè odoris, singulos foliorum sex, quorù tria interiora haud ita vt reliqua longa, colore subalbido, & cum tempore aliquantulum ad cæruleum declināte; in quorum medio tria stamina lutea, inter quæ stijlus exoritur trifidus, itidem luteus. Postquam verò flores defecerunt, ex radice sex vel plura folia de tenui involucro, in quo flores antè latuerant, prodeunt, paulo latiora & lineis cædescenscentibus variegata. Radix autem pollicari ferè crassitudine rotunda, cãdida, solida, subrufã tuniculã cincta, fibris in sessili parte pluribus donata est.

Byzantino jungitur hic secūda croci silvestris montani serotini species, florem ex brevi caule promens nudum Colchici instar, violacei propemodum coloris, nitore & odore gratissimo, spectatores non sine in credibili voluptate detinentem.

L. Crocus Byzantinus
Ge. Berch Saffraen van Constantinoplen

L. Crocus Montanus hispan.
Ge. Purper Spiens Berch Saffraen



25

NARCISCVS INCOGNITVS CLVITSY.

Narciscus hic incognitus, à nemine quod sciam præterquàm à Clutſio, neque id dum plenè deſcriptus, mihi à Petro Peretto Pharmacopæo Amſtelred: exoticarū plantarū curioſiſſimo exhibitus, plâta eſt exotica, & noſtris fere hominibus inviſa, quæ ex vaginâ pollicem p. m. craſſâ, ſolidâ, coloris viridis diluti, quam ambiunt quinque vel ſex larga, lata, dura que folia, cauliculos profert 14 vel 15 numero; ij ſinguli ſuis floribus ornantur coloris cyanei, Narcifco tertio Mathioli, vel lilijs ephemeris non multum diſſimilibus, duobus intus ſtaminulis veluti corniculis candidis luteos apices ſuſtinētibus, conſpicuis. Radix bulbosa eſt, magnitudine pugni virilis, parum à radice communis Narcifci diſtās.

L. *Narcissus marinus exoticus*: 25
Ge. Vremde zee Narcis.




RADIX VTRIVSQUE CYCLAMINI
SVpra DESCRIPTI.



Cyclamini radix magni semper à Medicis facta fuit, propter vsum eius in re medicâ non vulgarem. Quare & nos eandem vtriusque generis hic expressimus, vt non tantùm florum amatores, sed & Medici, Botanici, ac Pharmacopei meliùs eam dignoscere possint, cù exsiccata rugosa admodùm sit, & cognitu difficilior. Primi generis à Dodonæo descripti radix est rari forma in latitudinẽ se pandẽs, nigra, glabra, terrestris, & paululũ nitens, vnde protinus flosculi prodeunt suis è pediculis. Alterius verò ab hâc distat nitore, proferens caules perbreves, vnde folia & flosculi oriuntur, estque coloris subnigri ac ruffi. Vires harum radicum aduersus venena se extendere dicuntur, & parturientibus prodesse.

L. Radix Cyclamini folio hederæ.
Ge. Ertrape.



Radix Cyclamini præcociſ five Italici
Wortel van het ronde Italiaens verckens broot.



L. Bulbus Narcisci Marini.

*Ge. Den Bol van den
Indi:Zee Narcis.*



HORTVS FLORIDVS
HYEMALIS

C. R. PASSÆI FIL.

LABORE ET INDVSTRIA

NVNC PRIMVM IN LVCEM EDITVS

ANNO MDCCXIII.



VĒTRAIECTI.

Ex Officinâ Calcographicâ C. R. PASSÆI.

INDEX.
HORTI FLORIDI HYEMALIS.

M <i>Ezereon & Piper montanum.</i>	Fol.1.
<i>Helleborus niger.</i>	Fol.2.
<i>Pseudo Helleborus niger.</i>	Fol.3.
<i>Leucoion trium generum bulbosum.</i>	Fol.4.
<i>Aconitum. Lut: hyem.</i>	Fol.5.
<i>Hepatica Trifolia.</i>	Fol.6.
<i>Crocus flore argent Crocus aureo purpureo striato Flo- re.</i>	Fol.7.
<i>Pseudonarcissus Luteus Maior Hispan. Narcissus Pu- milis.</i>	Fol.8.
<i>Pseudo Narcissus Iuncifolius minor, flore luteo. Pseudo Narcissus Iuncifolius Flore albo.</i>	Fol.9.
<i>Dens Caninus albo Flore Dens caninus rubro purpureo Flore.</i>	Fol.10.
<i>Hyacinthus Botryodes</i>	Fol.11.
<i>Hyacinthus Germ: Liliflorus Stellaris Hacinchus Po- lyanthes cineritio Flore.</i>	Fol.12.

Non Hyemis potuere rigentia frigora nimbis
 Candenti que adeo constringere grandine ter-
 ram,
 Quin medias inter que nives inter que pruinas
 Conetur varias Florum proferre figuras.
 Nam Boreæ cœli que minas industria vicit
 Humana, ignotas que novo traduxit ab Orbe
 Plantas, quas docuit nostris assuescere ventis.
 Has nobis P A S S Æ E tuo nunc exprimis ære,
 Spectandas clauso pulcrè præbes que cubili:
 Pro quo florentem optamus tibi munere vitã,
 Perpetuum que etatis ver, viridem que senectã,
 Et tumulum nullo careat qui floribus ævo.

A. B.





Epigramma.

FLORA naturæ reserans recessus,
 Exhibet blandas violas, rosasq;
 Quicquid et dites Arabes remittunt.
 Spargit odorum.

A.

Simon Pascheus sculp. vbr.





Meridies

Oriens

Occidens

Septentrio

CHAMELÆA^{r.} LAVREOLA.



Hamelæa, Barbaris Mezereon; nomine Germanis infausto dicitur *Menschen dieb*, & officinis, rapiens vitam, ac faciens viduas, Arbuscula est humidis opacisque silvis nascens, ramulis dodrantalibus, folijs oliuæ sed tenuioribus, & amaris ac linguam mordicantibus. Flores mediâ hyeme & ante folia erumpunt purpurascens, violaceo odore non ingrati; vnde baccæ prodeunt, primùm virides, in Autumno verò Ari instar prorsus rubentes; quæ postquam aruerint, nigrum accipiunt colorem, harum nucleus similis ferè femini cannabis, candidâ repletur medullâ immensæ caliditatis. Radices oblongæ profundè terræ inherent.

Laureola sic dicta quod Lauri ferè sit folijs, licet minoribus & inodoris, plurimam habet cum Chamelæâ similitudinem: flosculi item eius sunt oblongi & cavi, sub vmbriâ foliorum prodeunt, colore ex viridi albescente; fructus verò virides cum maturitate nigrescunt, habentque nucleum oblongiorem. Radix quoque lignosa, longa, multiplex, fibras profundè in terram demittit.



L. Piper montanum .
 I. Olivella .
 G. Laureole .
 Ge. Klein Lawerbaum .



L. Mezereon .
 G. Boys gentil .
 Ge. Kellerhals ofte ,
 Boeren peper .

VERATRUM NIGRUM



Veratri nigri prima species hic expressa, nascitur in collibus asperis & sitientibus; folia habens ex pluribus oblongis collecta, quorum singularia sunt dura, glabra, & formâ quodammodo Laurinis similia, nisi quod multis à medio ad extremum divisuris incisa. Circa finem Decembris flores ex ipsis promittuntur radicibus, brevibus insidentes pediculis, initio candidos, inde nonnihil purpurascens, tandem verò in herbaceum colorem desinentes, plurimis in medio filis circa extremitatem flavescens, ornatos, quorum in centro semina in folliculis oblongis gignitur, quatuor aut quinque simul coniunctis Sefami modo: radices multæ instar fibrarum sunt, nigræ, & tenues in medio nervos habentes, quæ eximiam purgandi vim obtinent.

L. *Helleborus niger*.
I. *Elleboro nero*.
G. *Viraire noir*.
Ge. *Christwurtz* ofte
Swart Niescruyt.

d. 2.



3.

PSEUDOHELLEBORVS NIGER.

Pseudohelleborus niger, Consiligo Plinij à quibusdam creditus, Helleborastrum quoque dicitur, & in multis cum Veratro nigro vero convenit: folia tamē habet minora & nigriora, marginibus serratis; caulē verò pedis longitudine, circa summitatē in plures ramulos divisum, ex quibus flores quàm veri veratri nigri minores, ex viridi diluto colore, circa mergines foliorum nonnihil flavescentes, deorsum dependent; stamina in medio plura, mellini coloris nodulis onerata, habentes, in quorum centro siliquæ tres quatuorve oriuntur, quibus semē, cū maturuerit rotundū & nigrum, continetur. Radix etiam est ex multis fibris sed tenuioribus & minus atris intricata & contexta.

L. *Pseudo Helleborus niger*.
Ge. *Elleboro nigro*.

L. *Ellebore noir bastard*.
Ge. *Wrangetruye*.



4.

LEVCOIVM BVLBOSVM TRIPHYLLON,
TRIVM GENERVM.



Leucoium triphyllū bulbosum, ex vnaquaque radice circa Februariū mensem bina producit folia, oblonga, tenuia, ex viridi albescētia, Pseudonarcissi flore luteo folijs, quantum ad colorem, non admodum dissimilia; & cauliculum è medio foliorum exeuntem palmarem & nudū; membraneum folliculum extremâ parte ferentē, è quâ flos vnicus nutans & pendulus erumpit, sex candidissimis folijs constans, quorū tria externa omnino nivea, alijs longiora latioraque sunt, tria interna breviora, & bifulca, virescente limbo extremitatis ambiente: mediū florem plura stammina crocea stilusque exilis candidus, occupant; flori succedunt membranea capitula, olivæ virentis formam propemodum exprimentia, in quibus semen continetur. Radix bulbosa est, multis candidis tunicis (extremâ tamen parte fuscâ) constans, sessili parte multis tenuibus fibris prædita; quæ faciliè multiplicatur, & alios à se bulbos generat. In Italia frequens est, hic nisi in hortis curiosorum minimè invenitur.

Leucoium bulbosum Byzantinum precox, binis quoque folijs prodit sed latioribus, cauliculus etiam crassiusculus vnicum fert incundi odoris florem, superiori similem, sed maiorem, tribus externis folijs alarū modo expansis planè niveis, interioribus vero brevioribus simul coniunctis & veluti tubulum efficientibus, magna ex parte virescentibus, deinde circa oras albis, quas tamen extremas virides maculæ inficiunt.


Tertium genus cum præcedentibus in plerisque convenit; nisi quod plura habeat folia & flores lineolis nonnullis diversitatem præ se ferre videantur.

L. Leucoion bulb.
Tryphylon.
G. Witte Tyde:
lofen.

L. Leucoion Triph.
Byzant : .

L. Leucoion secund.
Dod.

4 d



5.
ACONITVM HIEMALE, VEL LVTE-
VM MINVS.



Conitum à colle quodam Aconiti, qui est prope Heracleam Ponticam v-
bi Hercules Cerberum, è cuius spumâ Aconitum natum est, ex inferis ex-
traxit, nomen habere, veteribus persuasum fuit. Luteum verò Aconitum
minus, hic descriptum, incipiente anno, non admodum à terrâ se extollit,
neque alios profert cauliculos quàm quibus folia adherēt, breves, vix pal-
mares & tenues; Et è singulis singula nascuntur folia, rotunda, & radiorum
instar profundè crenata; quorum è medio interdum flosculus prodit exiguus, Ranunculi,
fere similis, nisi quod capitulum non habeat, sed eius loco tres vel quatuor folliculos, in
altum erectos, in quibus semen latere solet. Radix est crassa, nodosa & veluti articulis
distincta, acri admodum saporis; è quâ pediculi oriuntur qui folia sustinent. In locis mon-
tanis & collibus Italiæ, ac potissimùm circa Patavium abundat.

s.d

L. *Aconitum luteum*.
G. *Tue lup jaune*.
Ge. *Winter geel Wolfswortel*.



6.
HEPATICA TRIFOLIA, RVBIDIS ET
CÆRVLEIS FLORIBVS.



Hepatica trifolia (aureum ab alijs trifolium dicitur) herba est nullo scapo prædita, sed ex radice varijs fibris hinc inde dispersis, multiplici, folia statim tenuibus & teretibus cum cauliculis promit, Asari folijs non multùm dissimilia, nisi quod ternis incisuris, ita vt trium foliorum instar videri possint, distinguuntur; inter quæ similibus è cauliculis, vix dodrante longioribus, ex viridi purpurascens, singulis, singuli nascuntur flosculi, Ranunculi vel stellari formâ, sex pluriusve foliolis constantes, & in medio siliquas, erinacei formâ, paucis candidis filis circumdatas, habentes, ex quibus semen subalbidû cum maturuit, spontè profilit: In Februario aut Martio mensibus lætâ varietate spectantur, vix aliâ quàm colorum inter se differentiâ luxuriantes. Hic verò duûm generum flores vnus rosei, alterius cyanei diluti coloris, exhibentur.

L. *Trifolium aureum*.
I. *Herba Trinita*.
G. *Hepaticæ fleur rouge*.
Ge. *Gulden Klee*.

L. *Hepatica trifolia*
caeruleo flore.

6.d.



7.

CROCUS FLORE ARGENTEO STRIATO
CROCUS AVREO STRIATO FLORE.



Rocus hic latifolius in numero silvestrium habetur, & promit incipiente anno folia, quàm sativus Crocus breviora, cæterò quin ferè similia; flores verò duos tréve, sex folijs, interdum etiam pluribus, constantes, orbiculato propemodum mucrone, colore argenteo, tribus aut pluribus violaceis lineis vel strijs exteriorum foliorum superficiem distinguentibus, qui tria quoque intus stamina flavescencia, triangulare item capitulú rotundo rufoque semine plenum, continét. Radix bulbosa est, plana, solida, aliquot tunicis obvoluta, colore foris cinericeo, intùs candido, fibris exalbidis sessili parte donata. Hi flores interdum duplicato aut triplicato foliorum numero, eleganti sanè formâ, ad maiorem spectatorum delectationem, prodeunt.

Croci vernalis aureus flos, violaceo admodum saturo, & ex nigro purpurascence colore, striatus, elegantia suâ oculos spectantium detinet; qui quantum foliorum numero accedit, tantundem gratiæ suæ addere, creditur: bulbus eius reticulatus esse videtur, globum obscurioris coloris reti inclusam exprimens.

L. Crocus flore argent:
violac: lucis striato.

L. Crocus arg: striato
polyphyllo flore.
Ge. Saffraen met dubb:
argentin: gestrep: blu:.

L. Crocus flore aureo
purp: striato.
Ge. Saffraen met goutgeel
gestrepte bloemen

L. Crocus pleno aureo
flore striato.



8.

PSEVDONARCISVS LVTEVS MA-
IOR HISPAN. NARCISVS PVMILVS.

Fluteus Pseudonarcissus silvester, vel maior Hispanicus, folia porri aut Narcissi similia promit, sed breviora, latiora, & magis erecta: caules dodrante maiores, atque in singulis flores singulos, Narcisso quoque formâ similes, sed maiores, & medio eorum calyce longiore, oblongioris calathi similitudine, colore per totû croceo, absque odore: capitula rotunda, oblonga, in quibus semen. Radix est bulbosa, & sessili parte plurimis fibris crassioribus terræ firmatur. Crescit ibidē in locis montanis, & apud nos in hortos translatus floret Februario mense.

Narcissus verò Pumilus, vel minimus montanus, in Hispaniâ quoque frequens est, & quantitate tantum à maiori differt.


8. d.

L. *Narcissus pumilus*.

L. *Pseudonarcissus hispanicus*
G. Coquelourde.
Ge Gēel Tytloosen.



9.
PSEVDONARCISSVS IUNCIFOLIVS
FLORE LVTEO: PSEVDONARCISSVS FLORE ALBO.



Seudonarcisso iuncifolio minimo Montano hic expresso, folia sunt oblonga, angusta, crassa & propemodum rotunda, iuncis cum laevore, tum colore, & quodammodo flexibilitate similia; inter quæ medius exit caulis tenuis, in summo cuius, flosculus, campanulæ ferè instar, per totum luteus, marginibus extremis fimbriatis & leviter crenatis. Radix verò bulbosa & magnitudine nucis avellanæ, candida, tenui membranâ nigrâ integitur. In Hispaniæ montibus spontè nascitur, & in Belgij hortis jam spectatur.

Pseudonarcissus alter hic deliniatus ex iuncifolijs minimus est, flore albo, qui à luteo minimo parum differt, sed magis exilis, & ferè vnicus è cauliculo tenero vix dodrantali oritur.

L. *Pseudo Narcissus juncifolius*, min: flor: lut:.
Ge. Geele Narcissen met bieflader:.



L. *Pseudo Narcissus juncifolius*. d. 9
Ge. Witte Ionquillos.



DENS CANINVS, ALBO FLORE.
DENS CAN: RVBRO PVRPVREO FLORE.



Ens Caninus sive dentalis bina plerumque promit circa mensem Martium vel etiam maturius folia, rarò terna, ad Allij vrsini foliorum formam valde accedètia, at crassiora & magis carnosâ, multis magnis maculis ex atro purpurascensibus aspersa, basi angustâ paulatimque in latû extensâ, deinde sensim in mucronem desinentia: his explicatis, flos sese conspiciendum præbet, dodrantali pediculo enodi & purpuracente innitens, sex folijs oblongiusculis constans, deorsum inflexus & spectans. qui tepore aëris Solis radijs ex calefacti sese explicat foliaque sursum reflectit Cyclamini modo; flori succedit capitulum trigonum, continens aliquot semina oblonga, gracilia flavescente colore. Radix bulbosa sed oblongior & infima sede crassior, multisque candidis fibris stipata, & appendice quadam planâ, vnicâ, aut pluribus donata.

Dux hic expressæ sunt species, exiguâ præter colorum in floribus diversitatem, differentiâ; nam prioris flos major & totus fere lacteus, interdû etiam mixtis ex purpurascensibus & albo coloribus, senis intus staminibus candidis in atros nodulos desinentibus & stilo trifulco constat. Posterioris verò, eleganti diutioris purpuræ colore nitescens, nullâ quidem odoris, sed plurimâ coloris & maculatum gratiâ commendatur.


L. *Dens Caninus rubro flo.*

L. *Dens Caninus albo flo.*

d 10.



HYACINTHVS ^{II.} BOTRYODES.



Ria hic genera Pseudohyacinthi Botryodis, à floribus concavis ac tumētibus in racemi modum extremo caule congestis, sic appellati, describuntur. Primum crassioribus & longioribus est folijs, florumque racemo oblongiore, densiore, & odoratiore, colore admodum saturo. Secundum verò brevioribus, latioribus & firmioribus folijs, quę humi vt prioris, diffundi non solent, sed erecta sunt: huius flores licet similes sint formâ superiori, longè tamen adspectu elegantiores, dilutioris purpuræ ad cæruleum tendentis colore præditi sunt. Hoc genus spontè hic non nascitur, sed ex Tyrolensi comitatu delatū esse fertur. Tertium genus flore lacteo est, qui à superioribus formâ minimè differt, at nullâ vel perquam exiguâ odoris gratiâ commendatur, caulemque habet exalbidum, folia dilutius virentia, & quasi pallascentia. Omnium semina triangulis quibusdam vasculis continentur rotūda, nigrâ, exigua. Radix a. seu bulbus plurimos exiguos bulbulos in âbitu deponere solet.



L. Hyacinthus
botryoid: vulg:
G. Barreletz

L. Hyacinthus
botryoi: cerul:

L. Hyacinthus
botryoi: lact:

12.

HYACINTHVS GERM: HYACINT: POLY-
LILIFLORVS STELLATVS. ATHES CINERITIO FLORE.

IN hortis gratiam quoque invenit pseudohyacinthus, qui à floribus radiatim expansis, & in stellæ formâ decussatis, stellaris cognomen apud rei herbariæ studiosos obtinuit; cuius hic duo sunt genera expressa. Prius à foliorû in floribus formâ & loco vbi frequentius nascitur, Liliflori & Germanici nomine dicitur; cæruleum florem reliquis maturius proferens, & in triangularibus vasculis semen ferens, non atrû, vt cetera genera, sed fuscum dûtaxat, & veluti fuligine infectû. Radicis bulbus est exiguus, folia sunt paruula, angusta, cauliculus brevis. Posterius verò floribus medio inter cinericeum & cæruleum colore coronæ instar abundantius, ob gratiã suã fæcunditatem polyanthes merito cognomine superbit.

d. 12.

L. Hyacinthus Germ: Liliflo:

*L. Hyacinthus polyant:
cinerit: flo.*





ALTERA PARS
H O R T I F L O R I D I
I N Q V A P R Æ T E R F L O R E S,
V A R I A E T I A M C O M P R Æ H E N D V N T V R
A R B O R V M F R V C T I F E R A R V M, F R V C T I C V M,
P L A N T A R R V M Q V O Q V E E T H E R B A R V M
M E D I C I N A L I V M G E N E R A.

Per CRISP. PASSÆVM in lucem, edita.

1911

ПОЛТАВСКАЯ


ГОСУДАРСТВЕННАЯ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

КАТАЛОГ

The image features a highly decorative border. At the top and bottom are large, symmetrical scrollwork elements. On the left and right sides, there are two identical vases, each containing a bouquet of various flowers, including tulips and lilies. The central text is enclosed in a rectangular frame with a stippled background.

COGNOSCITE LILIA AGRI
QUOMODO CRESCANT, NON LA-
borant, neque nent: attamen dico vobis ne
Salomonem quidem in vniuersa gloria sua sic a-
mic tum fuisse, vnun ex his. Matth: 6. cap.

Formulis Crispiani Passeri et Joannis Waldhely.

1 *L. Chamæniolum*
G. Camemille ou Camomille
A. Chamomill
Ge. Camillen.



2



L. Oxyacantha
G. Epinis Vnoette
A. Barberries
Ge. Vrsich.





3



L. *Syringæ cerulea*
G. *Syringe bleu*
A. *Blew pips*

4



L. *Androsæmum*
G. *Abacé saine*
A. *Atsians or parke leavis*



L.
G.
A.
Ge.
Siligo
seigle
Rye
Roggen.



6
L. *Malica hortensis*
G. *Rose d'outer mer*
A. *Höll' hoke*
Ge. *Winter rosen*



7
L. Capifolium
G. Cheuresfeuille
A. Honigfuckles
Ge. Geisz bart.



L. Rubus Idaeus
G. Framboise
A. Raspis
Ge. Brombeer.

9

L. *Corylus avellana*
G. *Noisettes*
A. *Häselnüsse*
Ge. *Häselnüsse*.



10



L. *Armeria rubra*
G. *Grofftes rouges*
A. *Sweete Williams*
G. *Stein nehm.*



11



L. *Malva sylvestris*
 G. *Malves sauvages*
 A. *Mallowe*
 Ge. *Wilde pappelen.*


L. *Olea Latuca*
 G. *Olive*
 A. *Olyves*
 Ge. *Oliuen.*

12



13

L. Sanguisorba
G. Pimpernelle
A. Burnet
Ge. Pimpernell.



14

L. Antirrhinum
G. Teste de veace
A. A fraiz dragon
Ge. Kalbs kopf.



15
L. Iris
G. Flambe ou Glaycul
A. Flower de Luca
Ge. Blaw Gilgen.



16

L. Arzacanthus
G. Arbespine
A. Kainchorn
Ge. Weisser Hagdorn.





17
L. *Lychnis sylvestris multiplex*
G. *Oeillets ou Oeillets Dieu*
A. *Double campion*
Ge. *Frauen röslein.*



18
L. *Aespilus*
G. *Nesples*
A. *Medler*
Ge. *Aespe len.*





L. Caryophyls minimus
 G. Gyras les petites
 A. Single Red
 pink
 Ge. Keme Negelblouen.



L. Lunonia mala
 G. Limons
 A. Limons
 Ge. Limonen.



21

L. *Prunus Damascena*
G. *Pruniaux de Damas*
A. *Damsons*
Ge. *Pfäumen von Damas.*



22

L. *Leucoum*
G. *Violiere blancs*
A. *Stok gilloflower*
Ge. *Weiß & Viole.*





L. *Agri folium*
G. *Hous*
A. *Höllye*
Ger. *Halsen*.



L.
G.
A.







L. *Cynara sativa*
 G. Artichaux
 A. Artichoke
 Ge. Strabeldorn und
 Artischecken.

L. *Lychnis sativa*
 G. Veillets pruez
 A. Rosa Campion
 Ge. Zame frauen röselein.





Z 7

L. *Primula Veris*.
F. *Prine vere ou Blaites de Cocu*
A. *Primrose*
Ge. *Schlüssel Blumen*.



Z 8

L. *Pyrum*
F. *Du poires*
A. *Pearre*
Ge. *Biren*.





L. *Linaria purpurea*
G. *Lin sauuagc bleu*
A. *purpel Tods flax*
Ge. *Kamkrout* .



L. *Erica Caliculata*
G. *Bruyere*
A. *Châlie hearth*
Ge. *Kerde* .







31 *L. Sabina*
G. Saune
A. Saun
Ge. Sevenbaum.



32 *L. Papaver multiplex*
G. Pâvor dable
A. Double poppie
Ge. Magfamen.

35



L. *Vicia*
 G. *Vesce*
 A. *Tares*
 Ge. *Wicken*
 It. *Veccia saluatica.*

36



L. *Mille folium*
 G. *Mille feuille*
 A. *Yarrow*
 Ge. *Kalengarb.*



37



L. *Cerasia*
G. *Cheris*
A. *Cherries*
Ge. *Kierschen.*

38

L. *pseudo-Narcissus*
G. *Narcisses*
A. *Daffodill*
Ge. *Hörnungs Blumen.*



L. *Viola mariana*
G. *Mariettes*
A. *Country bells*

39



40
L. *Viola*




41



L. *Hyacinthus orientalis*
 G. Zacinthe d'Orient
 A. Blex Jacinth
 Ge. Merizen blumen.

42



L. *Juniperus*
 G. Geneure
 A. Juniper
 Ge. Wachholder.

43



L. Lychnis silvestris
G. Ceillets sauvage
A. Wild campion
Ge. Wilde hawen roßlin.

L. Lilium rubrum 44
G. Lis rouges
A. Red lillie
Ge. Rote lilien.





45

L. Ribes
G. Grosceilles
A. red Currans
Ge. S. Johans beerlin
oder treubin.



46

L. Acanthium album
G. Chardon argentin
A. white cotton thistle
Ge. Weisse wegdistel.





47

L. *Prunus mirabolans*
 G. Prunier
 A. Plumes
 Ge. Pflaumen.



48

L. *Caryophyllus*
 G. Groß tees
 A. Jagged pincks
 Ge. Negeln oder
 Grafhauen.



49

L. *Anagallis aquatica*
G. *Mouron aquatique*
A. *Water pimpinell*
Ge. *Wasser pungen*.



L. *Hordeum*
G. *Orge*
A. *Barlyc*
Ge. *Qers ec.*

50




L. *Viola martia*
 G. *Violette de Mars*
 A. *March Violets*
 Ge. *Mertz Violon.*



L. *Mala arantia*
 G. *Orenges*
 A. *Orenges*
 Ge. *Pomerantzen.*





53
L. Melo
G. Melons
N. Nasse melon
Ge. Melone





L. *Digitalis*
G. Gantes nostre dames
A. Foxe glove
Ge. Fingerhut.



L. *Adonis*
G. Helm
A. Helm
Ge. Teufelwurcz, Sen-
hutlein, und Narrenkappen.
Je. Napello.



56

L. *Pisum sativum*
G. *Pois domestiques*
A. *Garden pease*
Ge. *Grosse Erbsen*
It. *Peso maggiore*.



57

L. *Cyanus*
G. *Bluet*
A. *blew both*
Ge. *Kornblumen*.



58

L. Ficus
G. Ficus
A. Figgis
Ge Feige.



59

L. Aquilegia
G. Aueholes
A. Columbine
Ge Ackeley.





60

L. Fraxinus
G. Fesne
A. Askh
Ge. Aschenbaum.



L. Rosa
G. Roses
A. a Rose
G. Rosen.

61





62

L. Lycopsis
G. Byglossf. sauage
A. Wild Byglossf.
Ge. Wilde Gyznung.



63

L. Rufus
G. Brusf
A. Butchers Broome
Ge. Neysdorn.



L. Papauer Rheas
G. Papot Janages
A. Wild poppis
Ge. Wilder maysam
oder Klapper rofen.

64



65



L. Faba sativa
G. Fenes
A. Garden beans
Ge. Bonen.



L. Delphinicum
G. Pied d'Alouette
A. Larkes Kéele
G. Ritter sporen.



Morum Celsi
G. Mûre
A. Mulberye
Ge. Maulberbaum.



68



Libanotis L.
G. Herb francumense

69



L. Tanacetum
G. Tanacet.
A. Tanfje
Ge. Reinfarn.

79

L. *Nix quellana*
G. *Noisettes*
A. *Filbird nuts*
Ge. *Käfel Nüs.*



71

L. *Rosa*
G. *Roses*
A. *Rose*
Ge. *Röden.*



72



L. *Amygdalum*
 G. *Amandes*
 A. *Almond*
 Ge. *Amandelbaum.*

73



L. *Paralyfis*
 G. *Prime vere, culha o Ses de*
 A. *Cawslips* (Cocu.
 Ge. *Schlüssel bhannen.*

74



L. Ranunculus
 G. Bassinet
 A. Crawfote
 Ge. Hünenfels.


75



L. Acer maior
 G. Sycomorus
 A. Sycome
 Ge. Hagedorn.

76

L. *Nux juglans*
G. Noix
A. Walnut
Ge. Große Nuß,
oder Baumnuß.




77

L. *Volubilis minor*
G. Liseron
A. Bindweede
Ge. Kleine Wind.



78

L. Pinus cum comis
G. Pin
A. Pine apples
Ge. Nirtzhau
It. Pino.



79

L. Borrage
G. Borraches
A. Borage
Ge. Orenzung.






L. *Aquilegia duplex*
 G. *Anchores double*
 A. *Double columbine*
 Ge. *Doppel Akeley.*

L. *Pomicon*
 G. *Pome*
 A. *Apples*
 Ge. *Apffel.*





82

L. Malum Granatum
G. Pommes de granade
A. Pome granates
Ge. Granat apffel.



83

L. Gramen maritimum
G. Herbe de Mer
A. Idriff
Ge. Meergras.

84
L. *Gladiolus palustris*
G. Ienc de riviere
A. Water gladioll
Ge. Wasser biejen.



85
L. *Horminum Sylvestre*
G. Oruale Souwage
A. Wild Clarie
Ge. Wilde Scharley.





86

L. *Malum Assyriacum*
 G. *Pomme d'Assirie*
 A. *Assyrian apple*
 Ge. *Assyrischer apffel*



87

L. *Calendula*
 G. *Soucy*
 A. *Marigold*
 Ge. *Ringelblumen*



88



L. *Ruta muraria*
 G. Rue de Miraille
 A. Rue madenhare
 Ge. Mäur rauten.

89



L. *Saponaria*
 G. Herbe à savon
 A. Sape worte
 Ge. Seipkraut.



L. *Rosa moschata*
G. *Rose muscadeau*
A. *Müske rose*
Ge. *Müscus oder Do-*
sem's Rosen.



L. *Cucumis*
G. *Concombre*
A. *Cucumber*
Ge. *Cucumern.*



92

L. *Othonia*
F. *Othone*
A. *French Marigold*



93

L. *Cicer sativum*
F. *Pis cices*
A. *Ciche peas*
Ge. *Kichern*.






24 L. *Viola tricolor* Dod.
G. Pensees
A. Hartes eafe
Ge. Freysam kraut.



25 L. *Malum carbonarium*
F. Pomme Charbonnier
A. Pome water



Ge. Apffel

26

L. *Tamariscus*
G. *Tamaris*
A. *Tamariske*
Ge. *Tamarisken.*



27

L. *Linaria*
G. *Lin sauwege*
A. *Tods fax*
Ge. *Harnkraut.*



98

L. *Bellis flori rubro*
 G. *Marguerites, ou Pâquerette à fleur*
 A. *red Double daisy* (rouge)
 Ge. *rote Maiglöckchen*.



99

L. *Quercus*
 G. *Chestie*
 Ang. *Acornes*
 Ge. *Eichbaum*.





100

L. Gelsemium
G. Gelsenin
A. Jasminum



101

L. Pyra
G. Pommes
A. Peartre
Ge. Birn.






102
L. *Lilium album*
G. *Lis blanche*
A. *White lillie*
Ge. *Weisse Lilgen*.

103

L. *Fragaria*
G. *Fraifes*
A. *Straw berries*
Ge. *Erdbeer*.





104

L. *Pseudo melanthium*
G. *Nielle de bledz*
A. *Cockle*
Ge. *Raden.*



105

L. *Cerasa*
G. *Cheresses*
A. *Cheryes*
Ge. *Kietser.*





L. Mala Persica
G. Pefches
A. Peches
Ge. Pfirsing.

107



L. Lychins Chalardonica
G. A. flower of Constantinople




108.

L. Spica lavendula
G. Lavendule
A. Lavender
Ge. Lavendelen.



109

L. Armeiaca malus
G. Abricos
A. Aprecocke
Ge. S. Johans
Pferfich.







110
 L. Caryophylli maximus
 G. Grosslees grand
 A. Carnations double
 Ge. Grosse doppel Neger
 oder Gras blumen.



111



L. Genista
 G. Genest
 A. Broome
 Ge. Gmseren oder
 Pfrimmen.



112

L. *Salvia*
G. *Sauge*
A. *Sage*
Ge. *Salweg*.



113

L. *Castanea*
G. *Chastaigne*
A. *Chefnuts*
Ger. *Kesten*



114




L. Pomum
 G. Pommies
 A. Apple
 Ge. Apfel.

L. Rosa canina odorata
 G. Esglantine
 A. Sweete Briar
 Ge. Wilde robrichende
 hege rosen.

115





116




L. Triticum
G. Ble, fourment
A. Wheate
Ge. Weitz.

117



sive multiplex
L. Caryophyllo duplex
G. Gyroflees doubles
A. Double gilloflower
Ge. Doppel negēn oder
grasblumen.



118



L. Malum cotoneum
G. Pome de Coing
A. Quinces
Ge. Kitten oder
Quälden.

119



L. Leucoium
G. Girafflee
A. Wall flower
Ge. Garten veiel.





L. Botrys, Vna
G. Grappe de raisin
A. A Grabe
Ge. Wein traube.

Handwritten signature or initials, possibly "J. P. I." with a horizontal line above it.

Handwritten signature or initials, possibly "J. P. I." with a horizontal line above it.

Small handwritten mark or character.


Small handwritten mark or character.

17 POK
2500

1st edition, complete
2 Parts; 175 leaves.

S. Savonarola "La" the...
(Trans. B. ... Dec. 1925)

The title-page, the printer's marks
and plates 60/61 of Italian parts
have been re-arranged



L